



LA RECHERCHE

VIVALTO SANTÉ


Accompagner les praticiens pour
mieux soigner les patients

2024

 VIVALTO SANTÉ

SOMMAIRE

- 3** Édito du Directeur Médical Groupe
- 4** Chiffres et dates clés
- 6** Instances
- 8** Missions et engagements
- 9** Rencontres
- 10** Accompagnement de l'activité de la recherche
- 12** Recherche paramédicale
- 14** Dynamiques européennes
- 16** Focus urologie
- 17** Focus activité et top recruteurs
- 22** Focus cardiologie
- 24** Études cliniques
- 46** Publications associées aux études cliniques
- 48** Publications scientifiques



ÉDITO



Dr Philippe Souchois
Directeur Médical Groupe
Membre du Comité Exécutif

En 2024, dans un contexte exigeant, le Groupe accélère l'impact positif de ses activités au bénéfice de la santé des patients et répond aux attentes des professionnels de santé. Les principaux atouts de Vivalto Santé en font plus que jamais un groupe singulier du secteur hospitalier privé français : 3^{ème} voie renforcée à travers l'actionnariat médical et la gouvernance partagée, qualité et sécurité des soins, recherche et innovation médicales, expérience patient, capacités d'investissement mais aussi développement à l'international dans 5 nouveaux pays.

Le Groupe investit massivement dans les équipements (robotique da Vinci), les technologies innovantes et accompagne les équipes dans la transformation numérique avec des outils dédiés de téléexpertises (Omnidoc) et de télé-suivis (Cureety) par exemple.

Dans une ambiance générale morose pour les soignants, Vivalto Santé veut promouvoir le leadership médical et l'illustrer dans de nombreux domaines, notamment à travers des projets de recherche ambitieux et à travers l'enseignement.

La progression constante, tout au long de ces années, des projets de recherche témoigne de l'engagement du plus grand nombre, de l'intérêt de connecter des communautés médicales, de promouvoir les expertises dans les différents pays et de partager les grands enjeux métiers à l'échelle du Groupe, de pair à pair. La qualité de la recherche médicale Vivalto Santé, encadrée par des instances clefs (conseil scientifique du GCS VS ERI et Comité d'éthique de Recherche Clinique) contribue à valoriser les équipes et à


asseoir la légitimité du Groupe devenu un acteur incontournable du secteur.

Retenons de cette année 2024 deux projets emblématiques au-delà de tous ceux qui composent cette édition : le lancement de la première étude Vivalto Santé multicentrique initiée conjointement en France et au Portugal et la première étude paramédicale publiée confirmant ainsi notre engagement fort à fédérer les équipes autour de projets collaboratifs. Pour illustration, on retiendra aussi le registre TVNIM-AFU (identification de biomarqueurs urinaires) qui mobilise acteurs privés, publics et centres de lutte contre le cancer, projet qui implique 13 de nos établissements.

Amplifier notre activité de recherche est au cœur de nos priorités 2025. La volonté d'un nombre croissant de praticiens et, plus largement de soignants, de s'y investir pleinement, l'intégration de nouvelles équipes médicales liée à la croissance externe, le programme de labellisation interne des équipes médicales, la labellisation des Instituts de cancérologie et des centres de référence en cancérologie, le développement de la promotion Vivalto Santé, le déploiement international, l'intérêt de l'industrie pharmaceutique mais aussi des grands acteurs institutionnels tels Unicancer, l'AFU (Association française d'Urologie), notre participation aux PHRC (Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique) sont autant de perspectives enthousiasmantes d'innovation, d'expertise et de progrès au bénéfice de nos patients.

Continuons d'entreprendre tous ensemble !

Les chiffres clés du Groupe



Les temps forts de la Recherche Vivalto Santé

2010

Naissance du Groupe Vivalto Santé
autour d'un modèle unique de
gouvernance partagée, la 3^e Voie.

3 établissements bretons

2012

Création de la Direction de la
Recherche Clinique.

8 établissements

2016

Création du GCS VS ERI,
Groupement de Coopération Sanitaire.

21 établissements

2015

Création du CERC-VS, Comité d'Éthique
de la Recherche Clinique et de l'Institut
Vivalto Santé.

15 établissements

2018

Lancement des premières
activités de promotion.

27 établissements

2021

Premier groupe privé de santé à devenir
entreprise à mission et à inscrire la Recherche
Clinique dans ses engagements statutaires.

50 établissements

2023

Confirmation du statut d'entreprise à mission après audit.
Amplification des projets de recherche paramédicale et
des projets de promotion.

93 établissements

2024

Le Groupe prend sa dimension internationale.
Lancement du 1^{er} projet de recherche Vivalto
Santé en France et au Portugal.

100 établissements

Des instances garantes de la qualité scientifique des projets de recherche

La gouvernance partagée avec les médecins et la transparence qui s'inscrivent dans les valeurs du Groupe sont deux piliers fondamentaux de la recherche clinique. La structuration forte de la Recherche Vivalto Santé illustre sa capacité à porter des projets d'envergure.

Le CGS VS ERI : un cadre de mutualisation des ressources humaines et techniques

Le GCS VS ERI apporte un accompagnement méthodologique et organisationnel dédié à ses membres dans le montage des projets et la soumission aux appels à projets, le soutien des travaux de publications et de communications scientifiques. Il recense chaque année l'activité de recherche grâce aux systèmes SIGAPS* et SIGREC** et est éligible à la dotation budgétaire MERRI***, permettant d'amplifier les projets de recherche à l'échelle d'un établissement comme à l'échelle du Groupe.

* Système d'Interrogation de Gestion, d'Analyse des Publications Scientifiques.
 ** Système d'Information et de Gestion de la Recherche et des Essais Cliniques.
 *** Missions d'Enseignement, de Recherche, de Référence et d'Innovation.

PROGRESSION DU NOMBRE DE PROJETS DE RECHERCHE

En 2024, 90 projets de recherche médicale ou paramédicale soutenus et/ou validés par les Autorités de Santé et initiés dans les établissements du Groupe.

Orthopédie.....	53		Algologie.....	1	
Oncologie.....	8		Chirurgie digestive.....	1	
Pharmacie.....	7		Chirurgie Plastique		
Anesthésie.....	3		Reconstructrice		
Enseignement.....	3		et Esthétique.....	1	
Ophtalmologie.....	3		Hématologie.....	1	
Gynécologie.....	2		Médecine Vasculaire.....	1	
Radiologie.....	2		Pédiatrie.....	1	
Paramédical.....	2		Pneumologie.....	1	

2024 90

2023 33

GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE (GCS VS ERI)

1 administrateur
tous les établissements
Vivalto Santé

Conseil Scientifique (CS)

RÔLE : ANALYSE ET ARBITRAGE – TRANSPARENCE

1 président
5 à 24 praticiens, représentants
du GCS et experts extérieurs organisés
en 4 collèges de spécialités médicales
et /ou paramédicales

Comité Restreint (CR)

RÔLE : GOUVERNANCE
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

1 président
5 à 8 membres



FOCUS



Le CERC-VS : répondre aux exigences d'un Institutional Review Board

CERC-VS a pour vocation de répondre aux exigences des revues anglo-saxonnes pour lesquelles l'avis d'un Comité d'Éthique Recherche (Institutional Review Board) est indispensable. Son rôle est de fournir un avis extérieur pour les études rétrospectives qui ne nécessitent pas l'avis d'un Comité de Protection des Personnes.


Le CERC-VS statue sur le caractère non-interventionnel d'une étude en vue d'une publication. Il peut également être saisi de tout avis éthique entrant dans le champ des activités pratiquées au sein du Groupe Vivalto Santé et y répondre de façon collégiale et multidisciplinaire.

2024 14 IRB délivrés

Comité d'éthique de la Recherche Clinique Vivalto Santé (CERC-VS)

RÔLE : AVIS ÉTHIQUE EN VUE DE PUBLICATIONS
ÉTUDES NON ÉLIGIBLES AU CPP

1 président
20 membres délibérants, experts
et représentatifs des champs d'intervention



Promouvoir avec force la recherche au bénéfice de nos patients

La recherche appliquée en santé constitue un enjeu majeur de progrès pour les patients et la société. L'amélioration des soins est en effet rendu possible par l'amélioration des connaissances scientifiques et l'évaluation de nouvelles stratégies thérapeutiques, nouveaux dispositifs de soin ou nouvelles prises en charge.

Chaque nouveau projet de recherche représente une chance de franchir de nouvelles étapes dans la prise en charge des patients, de leur qualité de vie en leur permettant d'accéder précocement à des avancées thérapeutiques ou à des évolutions de pratiques.

La Recherche Vivalto Santé est engagée de longue date dans cette démarche, portée par la volonté conjointe des praticiens et du Groupe, fidèle à une gouvernance partagée, le cœur de son ADN et de sa différence. La structuration importante de la Recherche Vivalto Santé avec des instances et des moyens dédiés à la mesure de la dynamique du Groupe permet d'encourager un nombre croissant de projets d'envergure et de favoriser la promotion, avec toute l'intégrité et la transparence requise.



La Recherche Vivalto Santé est un levier fort pour fédérer les équipes autour de l'engagement pionnier du Groupe et d'objectifs validés en tant qu'entreprise à mission. Le premier des objectifs statutaires, centré sur la qualité de prise en charge du patient, constitue un amplificateur de progression de l'activité de la recherche médicale et paramédicale. Il est porteur de l'énergie collective à l'échelle du Groupe à :

- **Promouvoir la recherche médicale et paramédicale sur tous nos territoires, dans la diversité des programmes de recherche engagés auprès des industriels français et étrangers comme des promoteurs académiques. Plus largement encore dans les expertises variées et complémentaires des praticiens et soignants contributeurs avec la capacité dans nos établissements à porter nos propres projets.**
- **Soutenir la recherche avec des moyens dédiés, des expertises complémentaires et des instances garantes du cadre réglementaire pour accompagner de plus en plus de contributeurs dans cette activité afin d'encourager la progression de projets d'investigation et de promotion, à finalité de publications.**
- **Valoriser la recherche et les équipes qui y contribuent en répertoriant l'ensemble des publications scientifiques des contributeurs du Groupe, grâce à la plateforme Sigaps et offrir une visibilité de cette activité au plan national dans le cadre du financement MERRI. En interne, en partageant l'activité de la Recherche Vivalto Santé auprès des praticiens, dans toutes les spécialités pour qu'elle se diffuse dans tous nos territoires.**

Renforcer la visibilité de la recherche auprès de nos communautés

Le Groupe Vivalto Santé participe aux temps forts de la recherche que sont les congrès médicaux, lieux de partages privilégiés des connaissances et des travaux les plus récents sur des sujets majeurs de santé. Ainsi, sa présence au congrès national d'oncologie IFODS*, aux Journées HLA** et son implication au congrès annuel SOFFCOMM*** ont donné lieu à des rencontres stimulantes avec des médecins, chirurgiens, chercheurs, internes mais aussi avec les acteurs institutionnels, sociétés savantes engagées dans ces disciplines.

*IFODS : International and French Oncology Days

** HLA : Hématologues Libéraux Associés

***SOFFCOMM : Société Française et Francophone de Chirurgie de l'Obésité et des Maladies Métaboliques



Nicolas Bioulou - Congrès SOFFCOMM.



Dr Emmanuel Capitaine - Congrès IFODS



Dr Philippe Souchois
Directeur Médical Groupe
Membre du Comité Exécutif

Notre engagement à faire rayonner la recherche, à soutenir des projets d'envergure et des publications scientifiques constitue un enjeu majeur pour nos patients et un levier d'attractivité médicale. La participation active des équipes de la Direction Médicale à ces événements sont autant de signaux forts à l'égard des praticiens intéressés à rejoindre la dynamique du Groupe.



Stéphanie Durel-Pinson - Dr Adrien Sterkers - Nicolas Bioulou - Congrès SOFFCOMM.



Hamza Bissaoui - Virginie Ropéro - Dr Philippe Souchois - Stéphanie Durel-Pinson - Dr Emmanuel Capitaine - Congrès IFODS.



Virginie Ropéro
Responsable Attractivité Médicale
Vivalto Santé France

La présence de Vivalto Santé à des congrès médicaux est une opportunité de valoriser la recherche clinique menée au sein de nos établissements, de partager nos expertises, et de communiquer sur les valeurs différenciantes du Groupe afin d'attirer de nouveaux praticiens.

Un soutien à la mesure de l'activité de recherche

La volonté d'amplifier l'activité de recherche et d'explorer de nouveaux champs, la forte mobilisation de nos praticiens et nos paramédicaux est à la hauteur de la dynamique du Groupe en termes d'accompagnement et de moyens dédiés. L'année 2024 inscrit le Groupe dans une progression croissante de projets d'envergure et une dimension internationale prometteuse ouverte à de nouvelles collaborations.

Aujourd'hui, la capacité du Groupe à porter ses propres sujets de recherche constitue également un moteur puissant pour fédérer la

recherche dans tous ses territoires et partager les avancées avec la communauté scientifique en publiant dans les revues internationales.

Le rôle de la Direction de la Recherche est de fournir, dans un cadre juridique structurant, le soutien et les ressources dédiées. Des expertises et des moyens qui facilitent la participation aux projets de recherche ou la promotion de nos propres études cliniques avec un objectif : améliorer le soin et donner accès aux nouvelles avancées thérapeutiques au plus grand nombre de patients.



L'équipe de la Direction de la Recherche.

Un accompagnement renforcé jusqu'à la publication



Accompagnement & coordination

- Gestion administrative, financière et logistique.
- Aide à la rédaction des documents protocolaires et à la contractualisation.



Expertise méthodologique et biostatistique

- Conseil à la conception du protocole méthodologique.
- Gestion de la soumission réglementaire.
- Expertise biostatistique.



Aide à la mise en place de l'étude

- Interface entre les différents acteurs impliqués.
- Suivi des inclusions et des parcours patient conformément au protocole.
- Recueil des données patients.



Soutien à la publication

- Analyse statistique de file active de patients, soumission aux revues à comité de lecture.
- Avis du Comité Ethique Recherche Clinique (CERC) Vivalto Santé (demande d'IRB Institutional Review Board).



La Direction de Recherche est constituée de 18 personnes avec des expertises complémentaires qui créent un environnement propice à l'engagement de multiples projets et contribue à la progression exponentielle de l'activité de recherche médicale comme paramédicale.



Stéphanie Durel-Pinson
Directrice de la Recherche
Vivalto Santé France

La complémentarité des expertises pour porter les projets



Nathalie Hasbini
ARC CHP Brest
Pasteur - Brest



Géraldine Lamure
ARC coordinatrice
Vivalto Santé France



Camille Kestler
ARC Les Hôpitaux
Privés Rennais –
Saint-Grégoire

■ L'ARC est le relai entre les médecins investigateurs, les promoteurs et les patients. C'est la garantie du respect des bonnes pratiques cliniques et du protocole prévu par le promoteur.

L'ARC est un maillon fort de la chaîne de la recherche qui se déroule depuis le soin jusqu'au cahier d'observation (CRF) pour relayer les données sources des patients au promoteur de l'étude.

Nous avons toujours en perspective l'accès à de nouvelles molécules innovantes qui deviendront dans un second temps un traitement ou un schéma de thérapie de référence en stratégie médicale.

C'est un métier d'engagement qui requiert une grande rigueur mais aussi des qualités d'écoute et de partage.

■ Ma principale mission consiste à coordonner l'activité des Attachés de Recherche Clinique du Groupe : 13 ARCs à l'échelle des établissements ou des territoires.

Je participe aux faisabilités des études ainsi qu'aux mises en place afin d'apporter mon expertise sur l'application du protocole dans le parcours patient existant. Sur l'ensemble des établissements du Groupe, j'accompagne les praticiens et les équipes sur les études de promotion.


Ma bonne connaissance du terrain est un atout. Faire ce lien concret entre la direction de recherche et le terrain répond aux besoins de transversalité des sponsors et des équipes.

Cela participe à une vision globale qui nourrit les compétences et enrichit l'accompagnement.

■ Mon rôle est d'appliquer le référentiel des bonnes pratiques cliniques (BPC). Il s'agit de garantir le respect de l'éthique, l'exactitude et la véracité des données, afin d'assurer le bon suivi et la sécurité des patients inclus dans un essai clinique.

La coordination des différents intervenants et services est essentielle en regard des exigences du protocole, ainsi que le suivi précis du parcours patient, qui permet un recueil de données de qualité.

Autant de missions enrichissantes et polyvalentes, où la santé du patient est véritablement au cœur des préoccupations.



La recherche paramédicale monte en puissance : une 1^{re} étude clinique publiée

Précurseur, Vivalto Santé a engagé activement ses territoires depuis 3 ans à développer la recherche paramédicale, axe très complémentaire de la recherche médicale. Composante essentielle de la progression de la qualité des soins au patient, la recherche paramédicale permet d'objectiver des pratiques en fédérant les équipes et en valorisant compétences et connaissances.

Encourager la recherche paramédicale par l'accompagnement

En tant qu'entreprise à mission, le Groupe a ainsi inscrit la recherche, et notamment la recherche paramédicale, dans son objectif statutaire lié au parcours patient. *“Nous démontrons notre volonté de valoriser la recherche paramédicale non seulement pour le bien de nos patients, mais également au bénéfice de toutes nos équipes soignantes”*, explique Stéphanie Durel-Pinson, Directrice de la Recherche.

Ainsi, le Groupe accompagne les équipes et apporte les ressources nécessaires de méthodologie, d'organisation, de réglementation et d'aide à la publication pour leur permettre de s'investir dans des sujets de recherche. Ces sujets proposés par les soignants eux-mêmes sont issus du terrain et de leur quotidien : ils répondent clairement à leurs besoins en matière de prise en charge des patients ou à leurs questionnements organisationnels.

Une première publication stimulante, de nouveaux projets en cours

Au premier plan de l'avancée de la recherche paramédicale, les équipes soignantes ont initié des projets différenciants dont l'un sur une thématique organisationnelle « soignants », ou encore sur les soins de support en cancérologie avec l'introduction de l'hypnose médicale par réalité virtuelle.

Cette année, une première étude* pilote randomisée vient d'être publiée, portant sur la durée optimale du refroidissement du cuir chevelu pour prévenir l'alopecie pendant la chimiothérapie adjuvante du cancer du sein.

L'alopecie est un effet secondaire courant de la chimiothérapie et peut être extrêmement pénible pour les patientes. Le refroidissement du cuir chevelu peut être utilisé pour réduire la perte de cheveux, mais la durée optimale du refroidissement n'est pas claire. L'objectif de cette étude clinique était de déterminer si l'augmentation de la durée du refroidissement du cuir chevelu améliorerait la préservation des cheveux.

Les résultats ont montré que le refroidissement de longue durée du cuir chevelu pendant la chimiothérapie augmentait l'inconfort des patient(e)s mais ne semblait pas améliorer la préservation des cheveux. Ainsi, il serait possible de porter le casque de refroidissement du cuir chevelu moins longtemps en ayant les mêmes effets. Cela réduirait l'inconfort des patientes et permettrait également à un plus grand nombre de malades de bénéficier de cette innovation technologique lors des traitements.

* Effectiveness of increasing the scalp cooling duration to prevent alopecia during adjuvant chemotherapy for breast cancer: a randomized pilot study. Supportive Care in Cancer (Mai 2024) 32:410
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38839667/>



Intégrer pleinement la recherche en soins infirmiers dès la formation

Avec les réformes du métier d'infirmier engagées au niveau national, des modules de recherche sont désormais intégrés à l'enseignement avec des stages dédiés. En accueillant des étudiants IBODE (Infirmier(-ère) de Bloc Opératoire Diplômé(e) d'État) dans le cadre de leur stage recherche pendant leur formation, le Groupe est partie prenante de cette évolution, tout en renforçant son attractivité auprès des futurs professionnels.



Camille Le Boulch

IBODE – Les Hôpitaux Privés Rennais
– Saint-Grégoire

Stage Recherche – Formation IBODE Promotion 2024

Participer à la recherche paramédicale permet aux infirmiers de questionner et d'optimiser les pratiques existantes, et de garantir ainsi sécurité, qualité et efficacité des soins chirurgicaux. Le module recherche dans la formation met en lien l'apport théorique avec la pratique lors du stage : c'est une nécessité pour assurer l'excellence des soins et l'innovation au bloc opératoire. Les IBODE, en intégrant cette dimension, deviennent des professionnels capables d'impulser des changements positifs, d'améliorer les pratiques et de valoriser leur expertise. Ils assurent ainsi la sécurité et le bien-être du patient.

L'intérêt est aussi l'amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels de santé comme le projet de recherche organisationnel déployé sur le territoire Ile-de-France Vivalto Santé auquel j'ai pu participer.

La compréhension des étapes de mise en place d'une étude ainsi que les éléments de langage spécifiques est facilitée grâce à l'accompagnement de la Direction de la Recherche Vivalto Santé France. Cela apporte une aide précieuse pour la méthodologie de notre mémoire de fin d'études.

Le stage de recherche clinique et paramédicale offre des perspectives enrichissantes pour prendre de la hauteur sur la pratique professionnelle et contribue à l'ouverture d'esprit.



REVUE
DE PRESSE




pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38839667/



www.vivalto-sante.com/presse/recherche-paramedicale-premiere-etude-clinique/

HOSPIMEDIA
L'actualité des territoires de santé

www.hospimedia-groupe.fr



La dynamique européenne en marche avec une première étude initiée



Équipe Lusíadas Portugal - Initiation de l'étude HyproMet.



Initiation de l'étude HyproMet - Lusíadas Portugal.

Avec le déploiement du Groupe à l'échelle européenne, une nouvelle dynamique s'installe entre les communautés médicales des différents pays. Elle témoigne d'un intérêt marqué à conduire des projets transversaux, à organiser les partages de connaissances et démultiplie les possibilités de collaboration à visée de publication.

Ainsi, les équipes de la Recherche Vivalto Santé en France et Lusíadas Vivalto Santé au Portugal ont initié un premier projet conjoint : l'étude HyproMet.

Cette étude multicentrique, comparative, randomisée a pour objectif principal d'évaluer les effets de l'hypnose médicale en réalité virtuelle sur l'anxiété chez des patients atteints de cancer de la prostate métastatique et recevant un traitement par chimiothérapie Docetaxel.

Les critères d'évaluation secondaires sont :

- les nausées-vomissements avant et après les cures
- la prescription des traitements antiémétiques à chaque cure
- la qualité de vie après la fin du traitement
- la satisfaction des patients après chaque cure

L'étude est conduite dans les établissements du Groupe Vivalto Santé sur 3 sites en France et 3 sites au Portugal.

L'hypnose médicale en réalité virtuelle

Les traitements contre le cancer sont souvent lourds et éprouvants pour les patients. Ils peuvent entraîner des effets secondaires avec un impact négatif sur la qualité de vie des patients et rendre leur traitement encore plus difficile à supporter.

La thérapie digitale immersive est un dispositif médical qui permet d'améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer en terme de gestion de la douleur et d'anxiété. Elle peut être bénéfique lors des séances de radiothérapie, de chimiothérapie et du parcours de soin.



Dr Xavier Artignan
Investigateur coordinateur

Promoteur : Les Hôpitaux Privés Rennais - Saint-Grégoire

3 sites Vivalto Santé en France

Clinique de la Côte d'Émeraude - St Malo – Dr Fabrice Ramiandrisoa

CHP Brest Pasteur - Brest - Dr Ali Hasbini

3 sites Lusíadas Vivalto Santé au Portugal

Hôpital Lusíadas - Lisbonne – Dr Paulo Cortes

Hôpital Lusíadas - Amadora – Dr Sergio Barroso,

Hôpital Lusíadas - Porto – Dr Miguel Barbosa



Dr Paulo Cortes
Medical Oncology Coordinator
Hospital Lusíadas Lisboa

La participation à ce projet collaboratif international de recherche en oncologie représente une opportunité exceptionnelle pour notre organisation. Elle permet de renforcer notre engagement envers l'innovation scientifique et d'améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer.

Pour le groupe Lusíadas, qui fait partie de Vivalto Santé, ce partenariat témoigne de notre volonté de contribuer activement à l'avancement de la recherche. En collaborant avec d'autres experts internationaux, nous pouvons partager nos connaissances, accéder à de nouvelles approches thérapeutiques et, in fine, offrir des soins de qualité supérieure à nos patients.



Stéphanie Durel-Pinson
Directrice de la Recherche
Vivalto Santé France

Le développement du Groupe à l'échelle internationale est porteur de projets d'envergure et offre des perspectives enthousiasmantes. Cette première étude européenne mise en place dans 6 établissements illustre notre capacité à travailler ensemble, forts d'une énergie collective et au bénéfice des patients au-delà des frontières.

Les réflexions et les partages de connaissance entre nos équipes respectives seront sources de futures collaborations à visée de publications.



Nicolas Schaettel
Co-founder & CEO HypnoVR

Depuis que nous avons créé HypnoVR en fin 2016 avec le Dr Chauvin et le Dr Graff, notre solution de traitement de la douleur et de l'anxiété associant l'hypnose médicale et la réalité virtuelle a été adoptée par plus de 600 établissements dans une trentaine de spécialités médicales.

Dès le début nous partagions une conviction avec les équipes de Vivalto Santé : l'innovation en santé ne peut être rendue accessible à grande échelle qu'à condition de démontrer son efficacité clinique. Nous travaillons depuis plusieurs années avec la Recherche Clinique de Vivalto Santé en ce sens et la récente étude HyproMet est l'exemple le plus récent de la concrétisation de cette conviction partagée et de l'efficacité d'HypnoVR, pour le bénéfice des patients et des équipes de soins qui l'utilisent au quotidien



Dr Eduarda Reis
Chief Medical Officer
Clinical Council President
Lusíadas Saúde - Portugal

La recherche clinique est un domaine stratégique pour le groupe Lusíadas car elle favorise l'amélioration continue des soins pour les patients et contribue au progrès médical.

Collaborer sur des projets de recherche avec Vivalto Santé en France est une opportunité enthousiasmante qui permet d'améliorer les soins et de nous rapprocher de nos collègues au-delà des frontières afin de partager des processus et des connaissances très enrichissantes à plusieurs niveaux. J'espère que ce premier essai clinique sera le premier d'une longue série qui suivra.



Dr Emmanuel Capitaine
Coordinateur médical
international

Vivalto Santé s'impose aujourd'hui comme un leader européen, présent dans 6 pays avec 100 établissements, prenant en charge 4,5 millions de patients chaque année.

Cette position unique ouvre un champ d'opportunité considérable pour faire avancer la connaissance médicale grâce à la recherche clinique. Ce premier projet « HyproMet », à la symbolique forte, marque une étape clé en fédérant les praticiens autour d'une démarche commune et ambitieuse. Je suis enthousiaste pour la suite compte tenu de la diversité des domaines dans lesquels nous pourrions construire de nouveaux projets et contribuer à l'avancement des connaissances grâce à des études multi pays.



FOCUS Urologie

Le Dr Léon est coordonnatrice nationale des établissements Vivalto Santé dans le cadre d'une étude française de grande envergure sur les tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle, promue par l'association française d'urologie (AFU). L'objectif de l'étude est d'identifier des biomarqueurs urinaires pour rechercher de manière non invasive une récurrence tumorale et donc de surseoir à la réalisation de la fibroscopie. L'étude va inclure entre 2 000 et 4 000 patients. **Les urologues de 13 établissements du Groupe Vivalto Santé sont impliqués dans cette étude.**

Pourquoi un registre ?

Ce registre prospectif offre plusieurs avantages : « *Il vous permet de documenter la prise en charge des tumeurs de la vessie non infiltrant le muscle, de justifier de votre activité en oncologie et constitue une base de données utile à la recherche. À terme, il sera indispensable pour les centres souhaitant poursuivre cette activité* », indique Yann Neuzillet, Secrétaire général de l'AFU.

« *Les registres sont indispensables pour évaluer nos pratiques, les nouvelles technologies, et certains biomarqueurs urinaires* », rappelle Alexandre de la Taille, Président de l'AFU.

Comment inclure les patients et alimenter la base de données ?

Dès la programmation d'une résection endoscopique, il est important de penser à inclure les patients dans le registre. Les informations nécessaires sont recueillies au fil du suivi : résultats de l'anatomopathologie, traitements reçus et fibroscopies effectuées.



Dr Priscilla Léon
Chirurgienne urologue
Clinique Pasteur - Royan

Pourquoi et comment inclure des patients dans ce registre TVNIM-AFU ?

Comment optimiser les inclusions en pratique ?

Le Dr Priscilla Léon répond : « *Nous avons simplifié le processus dans notre établissement, en fournissant des instructions claires aux patients. Par exemple, nous leur remettons des collecteurs dont le volume est adapté aux tests urinaires. Nous avons aussi organisé un suivi pour vérifier que les tests sont réalisés avant la résection ou la fibroscopie* ». Lors du suivi, il est essentiel de rappeler aux patients de refaire les tests pour éviter les inclusions incomplètes. « *Nous utilisons des alertes sur notre logiciel patient pour nous assurer que les tests sont bien effectués à chaque étape* », complète-t-elle.

Comment est financée la tenue du registre ?

La prescription des biomarqueurs est financée par le RIHN (Référentiel des actes Innovants Hors Nomenclature). Une fois inclus dans le registre, le suivi est géré par un ARC dédié, ce qui permet de décharger l'urologue.

Cette publication a été réalisée à partir de la séance sur le Registre TVNIM-AFU n° 1 du vendredi 22 novembre 2024, au 118^e Congrès français d'urologie.

REGISTRE TVNIM (Promoteur AFU)

1^{er} centre recruteur français

Clinique Pasteur Royan

Investigateur Principal

Dr Priscilla Léon


Une progression continue de l'accès au progrès médical Santé

Un acteur de poids dans le panorama national, européen et international


Le Groupe Vivalto Santé et ses établissements participent activement à la recherche pour permettre aux patients d'accéder précocement à des avancées thérapeutiques majeures dans le cadre des études cliniques. Les praticiens investigateurs des établissements du Groupe sont fréquemment salués pour leur forte contribution à inclure de nouveaux patients dans le cadre des études cliniques à l'échelle européenne.

Progression du nombre d'études

- Protocoles Oncologie internationaux et européens
- Études toutes Spécialités




Progression du nombre d'études toutes spécialités



Membre du réseau Arpego

ARPEGO (Accès à la Recherche Précoce dans la région Grand Ouest) est un réseau de collaboration inter-établissements hospitaliers et pôles de cancérologie afin de faciliter l'accès à l'innovation pour les patients de l'inter région atteints de cancer.



FOCUS Recruteurs



Dr Pierre Combe
Oncologue Radiothérapeute
Pôle Santé Léonard de Vinci
Chambray-lès-Tours



Dr Antoine Bruna
Oncologue Radiothérapeute
Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie
- Osny

ÉTUDE FRANÇAISE ALADDIN GETUG P17 (Promoteur ARTIC)

Évaluation de l'ajout du darolutamide à l'hormonothérapie et à la radiothérapie chez des patients atteints d'un cancer de la prostate avec des métastases ganglionnaires pelviennes.

27 centres ouverts en France

2^e centre recruteur français

Pôle Santé Léonard de Vinci - CORT37
Chambray-lès-Tours
(17 patients inclus)

Investigateur Principal

Dr Pierre Combe

ÉTUDE INTERNATIONALE FLAMINGO (Promoteur : Greenwich LifeSciences – Etats-Unis)

Étude de phase 3, randomisée, multicentrique, contrôlée par un placebo, visant à évaluer l'efficacité et la sécurité du peptide HER2/neu GLSI-100 (GP2 + GM-CSF) chez les patients HER2/neu positifs présentant une maladie résiduelle ou une réponse pathologique complète à haut risque de récurrence après un traitement néoadjuvant et adjuvant postopératoire à base de trastuzumab.

19 centres participants en France

3^e centre recruteur français

Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie - CROM95 - Osny
(2 patients inclus)

Investigateur Principal

Dr Antoine Bruna





Dr Xavier Artignan
Oncologue Radiothérapeute
Les Hôpitaux Privés Rennais - Saint-Grégoire - ICRB

ÉTUDE PEACE 6 - OLIGO-PRESTO (Promoteur Unicancer)

Prostate-cancer treatment diotherapy for oligometastases ablation in hormone-sensitive patients. A GETUG-AFU phase III randomized controlled trial.

41 centres ouverts en France

3^e centre recruteur français

Les Hôpitaux Privés Rennais -
Saint-Grégoire - ICRB
(25 patients inclus)

Investigateur Principal

Dr Xavier Artignan

ÉTUDE INTERNATIONALE LORIKEET

(Promoteur MACROGENICS)

A Phase 2, Randomized, Open-Label, Study of Lorigerlimab with Docetaxel or Docetaxel Alone in Participants with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer.

Étude internationale : 10 pays impliqués

France, 1^{er} pays recruteur

Les Hôpitaux Privés Rennais -
Saint-Grégoire - ICRB

Investigateur Principal

Dr Xavier Artignan



Dr Aurélien Gobert
Oncologue médical

1^{er} médecin recruteur



Dr Clément Perret
Oncologue Médical
Les Hôpitaux Privés Rennais -
Saint-Grégoire - ICRB

ÉTUDE FRANÇAISE PROPERTY (Promoteur CHU Nantes)

Étude randomisée, en double aveugle, multicentrique, contrôlée par placebo, évaluant la neurotoxicité chez des patients atteints d'un cancer gastro-intestinal métastatique prenant du phycocare ou un placebo pendant une chimiothérapie à base d'oxaliplatine.

6 centres ouverts en France

3^e centre recruteur français

Les Hôpitaux Privés Rennais - Saint-Grégoire - ICRB
(11 patients inclus)

Investigateur Principal

Dr Clément Perret



Dr Ali Hasbini
Oncologue
Radiothérapeute
CHP Brest Pasteur - Brest
Chambray-lès-Tours

ÉTUDE INTERNATIONALE FLAMINGO (Promoteur : Greenwich LifeSciences – Etats-Unis)

Étude de phase 3, randomisée, multicentrique, contrôlée par un placebo, visant à évaluer l'efficacité et la sécurité du peptide HER2/neu GLSI-100 (GP2 + GM-CSF) chez les patients HER2/neu positifs présentant une maladie résiduelle ou une réponse pathologique complète à haut risque de récurrence après un traitement néoadjuvant et adjuvant postopératoire à base de trastuzumab.

19 centres participants en France

2^e centre recruteur français

Les Hôpitaux Privés Rennais - Saint-Grégoire - ICRB
(4 patients inclus)

Investigateur Principal

Dr Clément Perret

ÉTUDE FRANÇAISE ALADDIN GETUG P17

(Promoteur ARTIC)

Évaluation de l'ajout du darolutamide à l'hormonothérapie et à la radiothérapie chez des patients atteints d'un cancer de la prostate avec des métastases ganglionnaires pelviennes.

27 centres ouverts en France

1^{er} centre recruteur français

CHP Brest Pasteur - Brest
(18 patients inclus)

Investigateur Principal

Dr Ali Hasbini



Dr Cyriac Blonz
Oncologue médical
L'Hôpital Privé du Confluent
- Nantes

ÉTUDE IMPROVE (Promoteur ARCAGY Gineco)

International Survey for Patients with EndoMetrial Cancer: PeRspectiVes and Expectation of Therapy and Quality of Life.

29 centres ouverts en France

3^e centre recruteur français

L'Hôpital Privé du Confluent
(49 patients inclus)

Investigateur Principal

Dr Cyriac Blonz



Dr Thomas Cuvier
Médecine Générale,
Soins de Support
Onco hématologie
L'Hôpital Privé du Confluent
- Nantes

ÉTUDE CAPNEUCHIM (Promoteur ICO)

Étude randomisée de phase 3 multicentrique en ouvert : comparaison de patch de capsaïcine 179 mg versus duloxétine dans le traitement des neuropathies périphériques chimio-induites.

11 centres ouverts en France

3^e centre recruteur français

L'Hôpital Privé du Confluent
(8 patients inclus)

Investigateur Principal

Dr Thomas Cuvier



Dr Alain Lortholary
Oncologue médical, oncogénétique
L'Hôpital Privé du Confluent - Nantes

ÉTUDE INTERNATIONALE ASCENT-03 (Promoteur GILEAD)

Study of Sacituzumab Govitecan-hziy Versus Treatment of Physician's Choice in Patients With Previously Untreated Locally Advanced Inoperable or Metastatic Triple-Negative Breast Cancer.

225 centres actifs à l'international
12 centres ouverts en France

Centre recruteur français

Hôpital Privé du Confluent

Investigateur Principal

Dr Alain Lortholary



Dr Faycal Hocine
Oncologue Médical
Clinique de l'Europe - Amiens

ÉTUDE FRANÇAISE LOGICAN (Promoteur UNICANCER)

Prostate-cancer treatment diotherapy for oligometastases ablation in hormone-sensitive patients.
A GETUG-AFU phase III randomized controlled trial.

28 centres ouverts en France

Centre recruteur français


Clinique de l'Europe - Amiens
(2 patients inclus)

Investigateur Principal

Dr Faycal Hocine


Une contribution dynamique aux publications scientifiques

Nombre de publications par spécialités*




*Spécialités les plus représentées

Progression du nombre de publications



REVUES DE CATÉGORIES A+

The Lancet
NEJM New England Journal Of Medicine
BMJ British Medical Journal



Nombre de publications par catégorie

Source : Direction de la Recherche
Groupe Vivalto Santé.
Source : données SIGAPS
(spécialités les plus représentées
sur la période 2020-2023).



Dr Marc Antoine Isorni
Cardiologie et maladies vasculaires

La recherche est l'un des fondements de la compréhension des maladies avec en corollaire, l'amélioration des prises en charge, l'accès à des traitements innovants, l'optimisation des soins. Elle contribue à la science et à l'innovation ainsi qu'à l'avancement de nos connaissances basées sur des preuves scientifiques. C'est le moyen de répondre aux défis médicaux actuels et futurs.

Si la recherche clinique médicale présente des bénéfices importants, elle comporte de nombreux impératifs éthiques, réglementaires, de financement, de sécurité pour les participants, et de complexité de l'interprétation des résultats. En cela, l'accompagnement de la Direction de Recherche Vivalto Santé est un soutien précieux.

Les perspectives de la recherche dans l'imagerie cardiaque sont vastes et extrêmement prometteuses, avec des avancées significatives en termes de résolution d'image, de personnalisation des soins, et de détection précoce des maladies cardiovasculaires.

L'intégration de technologies avancées telles que l'imagerie fonctionnelle, l'intelligence artificielle, et la fusion de plusieurs modalités d'imagerie ouvre de nouvelles voies pour un diagnostic plus précis, une prise en charge plus personnalisée et des traitements plus efficaces.

S'ils restent encore des défis à surmonter, notamment en matière de coût, d'accessibilité et de formation, l'objectif est bien de maximiser le potentiel de ces technologies dans la pratique clinique quotidienne au bénéfice de nos patients.



ÉTUDE COROSCAN-IA (PHRC)

Promoteur : Institut Mutualiste Montsouris

8 centres ouverts en France

1^{er} centre recruteur français

Centre Cardiologique d'Evекquemont
(17 patients inclus)

Investigateur Principal

Dr Marc Antoine Isorni



Dr Olivier Merceron
Cardiologie et
maladies vasculaires

ÉTUDE ARCACHON (PHRC)

Promoteur : AP-HP

40 centres ouverts en France

Centre recruteur français

Centre Cardiologique d'Evекquemont
(20 patients inclus)

Investigateur Principal

Dr Olivier Merceron



Dr Nassim Braik

Cardiologie Interventionnelle Coronaire et Structurale

Participer à la recherche clinique, c'est rester à l'avant-garde de notre discipline, garder l'émulation intellectuelle et la curiosité scientifique à la base de notre formation. Ainsi, nous pouvons également proposer à nos patients de bénéficier des thérapies les plus innovantes ou des stratégies thérapeutiques nouvelles dans un cadre scientifique et particulièrement sécurisé. Les patients sont d'ailleurs très fiers de participer aux avancées d'une prise en charge dont ils ont bénéficié. Et nos équipes au lit du patient, soignants, pharmaciens, administratifs et assistants de recherche cliniques se sentent particulièrement motivées et valorisées.

L'implication et l'engagement de la Direction de la Recherche Clinique Vivalto Santé dans la promotion et la mise en place des protocoles dans notre centre sont remarquables et très appréciables, à l'image de ce qui se pratique dans les CHU.

La pratique d'une cardiologie moderne dans un centre lourd avec beaucoup d'urgences cardiologiques comme le Centre Cardiologique d'Evreux, ne peut se concevoir sans la participation à la recherche clinique qui est extrêmement dynamique en cardiologie. Cela constitue également un très important levier pour inciter de nouveaux praticiens, attachés à l'idée de garder un haut niveau d'excellence académique à rejoindre une équipe libérale.

ÉTUDE EUROPÉENNE AMUNDSEN (PHRC)

Promoteur : AP-HP

43 centres ouverts en France

Centre recruteur français

Centre Cardiologique d'Evreux
(36 patients inclus)

Investigateur Principal

Dr Nassim Braik

ÉTUDE ANCHOR (PHRC)

Promoteur : AP-HP

36 centres ouverts en France

1^{er} patient inclus en France

Centre Cardiologique d'Evreux

Investigateur Principal

Dr Nassim Braik

A photograph of two women embracing outdoors. The woman on the left has dark hair tied up and is wearing a dark top. The woman on the right has blonde hair and is wearing a white top. They are both smiling and looking upwards. The background is a soft-focus green and yellow, suggesting an outdoor setting with sunlight.

ÉTUDES CLINIQUES

Engagés pour
améliorer la vie
des patients

Source : Liste des études cliniques en cours en 2024

INVESTIGATION Oncologie digestive

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
ACCORD 21 - PRODIGE 14 - METHEP-2	COLORECTAL 	2
Essai de phase II, randomisé multicentrique, évaluant le meilleur protocole de chimiothérapie associée à une thérapie ciblée choisie selon le statut RAS (KRAS et NRAS) dans les métastases hépatiques initialement non résécables des cancers colorectaux métastatiques (CCRM)		
CORESIM	COLORECTAL 	/
Cohorte prospective nationale évaluant les facteurs prédictifs de résistance à l'immunothérapie chez les patients ayant un cancer colorectal métastatique avec instabilité des microsatellites		
IROCAS	COLORECTAL 	3
A Phase III, Randomised, international trial comparing mFOLFIRINOX triplet chemotherapy to mFOLFOX for highrisk stage III colon cancer in adjuvant setting		
OPTIPRIME	COLORECTAL 	2
Étude de phase II évaluant le FOLFOX + panitumumab selon une stratégie de « stop-and-go » avec boucle de ré-introduction après progression sous fluoropyrimidine en traitement d'entretien, en 1ère ligne chez des patients atteints d'un adénocarcinome colorectal métastatique sans mutation RAS		
PANIRINOX	COLORECTAL 	2
Étude de phase 2 comparant FOLFIRINOX + PANITUMUMAB versus mFOLFOX + PANITUMUMAB dans les cancers colorectaux métastatiques chez des patients dont le statut B-RAF et RAS sauvage a été déterminé à partir de l'analyse de l'ADN tumoral.		
POCHI	COLORECTAL 	2
Pembrolizumab associé au xelox bevacizumab chez les patients avec un cancer colorectal métastatique microsatellite stable (mss) et un fort infiltrat immunitaire : étude preuve de concept		
PRODIGE 23 / NEOFIRINOX	COLORECTAL 	3
Étude de phase III comparant une radiochimiothérapie préopératoire à une chimiothérapie néoadjuvante par Folfirinox suivie de radiochimiothérapie préopératoire pour les patients atteints de cancers du rectum localement avancés (étude PRODIGE-GERCOR-SFRO-GRECCAR)		
PRODIGE 27 / LEANOX	COLORECTAL 	3
LEAN Body Mass Normalization of OXaliplatin Based Chemotherapy for Stage III Colon Cancer Patients Treated in Adjuvant Setting: Impact on Oxaliplatin-induced Sensitive Neurotoxicity. A Multicenter Phase II Randomized Trial		
PRODIGE 28 / TIME	COLORECTAL 	2
Étude de phase II randomisée comparant un traitement d'entretien par cetuximab seul à une pause thérapeutique en cas de cancer colorectal métastatique avec gène KRAS sauvage répondeur ou contrôlé après 8 cycles de FOLFIRI plus cetuximab		
PRODIGE 34 / ADAGE	COLORECTAL 	3
Étude de phase III randomisée évaluant la chimiothérapie adjuvante après résection d'un adénocarcinome colique de stade III chez les patients de 70 ans et plus.		
PRODIGE 49 / OSCAR	COLORECTAL 	3
Étude de phase III randomisée multicentrique. Oxaliplatine Systématique ou en Chimiothérapie intra-Artérielle combiné au LV5FU2 et une thérapie ciblée en première ligne de traitement des cancers colorectaux métastatiques limités au foie		
PRODIGE 50 / ASPIK	COLORECTAL 	3
Étude prospective randomisée en double aveugle aspirine versus placebo chez les patients opérés d'un adénocarcinome du côlon stade III ou II à haut risque de récurrence avec mutation PI3K		
PRODIGE 53 / SULTAN	COLORECTAL 	2
Étude de phase II randomisée comparant une intensification thérapeutique par chimiothérapie intra-artérielle hépatique et systémique à la poursuite d'une chimiothérapie systémique seule chez les patients ayant des métastases hépatiques exclusives d'un cancer colorectal jugées non résécables à l'issue d'une chimiothérapie systémique d'induction d'au moins deux mois.		
PRODIGE 54 / SAMCO	COLORECTAL 	2
Étude de phase II multicentrique randomisée comparant l'efficacité et la tolérance de l'avelumab versus un traitement standard en 2ème ligne chez les patients avec cancer colorectal métastatique et instabilité microsatellitaire (msi)		
PRODIGE 66 / COLAGE	COLORECTAL 	3
Phase III study to evaluate the Quality of Life in elderly patients with metastatic colorectal cancer receiving first-line therapy based on simplified geriatric parameters.		
PRODIGE 70/ CIRCULATE	COLORECTAL 	3
Décision de traitement adjuvant des cancers coliques de stade II basée sur l'analyse de l'ADN tumoral circulant.		
PRODIGE 71 / BEVAMAIN	COLORECTAL 	RIPH1
Étude randomisée de phase III comparant le traitement d'entretien fluoropyrimidine + bévacizumab versus fluoropyrimidine seule après chimiothérapie d'induction pour un cancer colorectal métastatique.		

INVESTIGATION Oncologie digestive

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
PRODIGE 85 / KANALRAD	COLORECTAL 	3
Essai de phase III multicentrique, prospectif comparant une chimiothérapie d'induction (DCF modifié 4 cycles) suivie de chimioradiothérapie à une chimioradiothérapie standard dans le traitement des carcinomes épidermoïdes de l'anus localement évolués (T3-4 ou N1a, b ou c).		
PRODIGE 87 / FOXTROT II	COLORECTAL 	3
Personnaliser et affiner l'utilisation de la chimiothérapie néoadjuvante dans le cancer du côlon localement avancé mais résécable chez les personnes âgées de 70 ans ou plus.		
SOREGATT	COLORECTAL 	2
Essai de phase II randomisé comparant les séquences de regorafenib et trifluridine/tipiracil, après échec des thérapies standards chez des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique.		
METAGIO - CA209-1408	ŒSOGASTRIQUE 	/
Étude française, prospective, observationnelle et multicentrique chez les patients traités par nivolumab plus chimiothérapie en première ligne de traitement du carcinome épidermoïde de l'œsophage, de l'adénocarcinome de l'œsophage, de l'adénocarcinome de la jonction gastro-œsophagienne ou de l'adénocarcinome de l'estomac.		
PRODIGE 32 / ESOSTRATE	ŒSOGASTRIQUE 	2
Essai intergroupe international Chirurgie systématique VS surveillance et chirurgie de recours dans le cancer de l'oesophage opérable en réponse clinique complète après radiochimiothérapie Essai multicentrique randomisé stratégique de phase II-III.		
PRODIGE 51 / GASTFOX	ŒSOGASTRIQUE 	3
Essai de phase III randomisé évaluant le folfox seul ou avec docetaxel (tfox) en 1ère ligne de chimiothérapie des adénocarcinomes oeso-gastriques localement avancés ou métastatiques.		
PRODIGE 55 / SOCRATE	ŒSOGASTRIQUE 	2
Seconde ligne de Chimiothérapie avec RAMucirumab +/- paclitaxel chez le sujet âgé avec un cancer avancé de l'estomac ou de la jonction oeso-gastrique.		
PRODIGE 59 / DURIGAST	ŒSOGASTRIQUE 	2
Étude de phase II randomisée évaluant l'efficacité du FOLFIRI + durvalumab vs FOLFIRI + durvalumab + tremelimumab en deuxième ligne de traitement chez des patients présentant un adénocarcinome gastrique ou de la jonction oeso-gastrique avancé.		
PRODIGE 62 / OESIRI	ŒSOGASTRIQUE 	2
Nal-iri/lv5fu versus paclitaxel en deuxième ligne de traitement chez les patients atteints de carcinome épidermoïde de l'œsophage métastatique.		
PRODIGE 73 / LOGICAN	ŒSOGASTRIQUE 	2
Étude de phase II randomisée évaluant trifluridine/tipiracil plus oxaliplatine versus FOLFOX chez des patients atteints d'un adénocarcinome de l'estomac, de l'oesophage ou de la jonction oesogastrique localement avancé, en récurrence ou métastatique non éligibles à une trichimiothérapie.		
VALIDIVE	ŒSOGASTRIQUE 	2B/3
Étude de Phase 2b/3, multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo comparant l'efficacité et la tolérance d'un comprimé buccal muco-adhésif de clonidine à celle d'un placebo pour la prévention de la mucite buccale sévère induite par la chimiothérapie chez des patients atteints d'un cancer oro-pharyngé.		
GEMFOX	PANCRÉAS 	3
Essai de phase 3 randomisé comparant le FOLFOX à la gemcitabine en 1ère ligne métastatique chez les patients avec un adénocarcinome du pancréas et non éligibles au FOLFIRINOX		
PRODIGE 44 / PANDAS	PANCRÉAS 	2
Two Arm, Prospective, Multicenter Randomized Phase II Trial of Neoadjuvant Modified Folfirinox Regimen, With or Without Preoperative Concomitant Chemoradiotherapy in Patients With Borderline Resectable Pancreatic Carcinoma - Neoadjuvant mFolfirinox With or Without Preoperative Concomitant Chemoradiotherapy in Patients With Borderline Resectable Pancreatic Carcinoma (PANDAS-PRODIGE 44)		
PRODIGE 61 / FUNGEMAX	PANCRÉAS 	2
Étude de Phase II randomisée pour les cancers du pancréas métastatiques comparant 5-FU/LV+Nal-IRI, versus gemcitabine+Nab-paclitaxel versus un schéma séquentiel alternant tous les 2 mois 5-FU/LV+Nal-IRI et gemcitabine+Nab-paclitaxel		
PRODIGE 81 / TRIPLET	HÉPATIQUE 	2/3
Étude de phase II-III, ouverte randomisée, évaluant l'intérêt de l'ajout de l'Ipilimumab à la combinaison Atézolizumab-Bévacizumab chez des patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire en première ligne de traitement systémique		
PROPERTY	ŒSOGASTRIQUE-COLORECTAL-PANCRÉATIQUE 	2
étude multicentrique randomisée de phase 2 en double aveugle qui compare, un bras placebo à un bras associant la molécule Phycocare (phycocyanine) du laboratoire ALGOSOURCE dans les chimiothérapies des cancers digestifs métastatiques utilisant l'oxaliplatine		

INVESTIGATION Oncologie gynécologique

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
CHRONO	OVAIRE 	2
Étude de phase II, multicentrique, contrôlée, en ouvert, chez des patientes avec un cancer ovarien non résécable nécessitant un traitement par chimiothérapie néoadjuvante.		
EORTC 1508	OVAIRE 	2
Étude de phase II portant sur l'anticorps anti-PD-L1 atézolizumab, le bévacicumab et l'acide acétylsalicylique visant à évaluer la sécurité d'emploi et l'efficacité de cette association dans le cadre de l'adénocarcinome ovarien, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif récidivant et résistant au platine.		
CHIPOR	OVAIRE 	3
Étude randomisée de phase III évaluant la chimiothérapie hyperthermique intra péritonéale dans le traitement du cancer de l'ovaire en récidive.		
FEMIMU	OVAIRE 	/
Étude FEMIMU - Fertilité, grossesse, contraception et prise en charge des symptômes de la ménopause après un adénocarcinome mucineux de l'ovaire en France.		
KELI-PAOLA	OVAIRE 	/
Étude ancillaire PAOLA-1 : Validation rétrospective du KELIM comme facteur prédictif et pronostic d'un traitement d'entretien par inhibiteur de PARP après une chimiothérapie à base de platine dans le cancer de l'ovaire en 1 ^{re} ligne (KELI-PAOLA).		
KEYNOTE B96	OVAIRE 	3
Étude de phase 3, randomisée, en double aveugle, évaluant l'efficacité du pembrolizumab versus placebo en association au paclitaxel avec ou sans bévacicumab chez des patientes atteintes d'un cancer ovarien récidivant, résistant au platine.		
NIRVANA-1	OVAIRE 	/
Étude randomisée comparant Paclitaxel-Carboplatine suivi d'une maintenance par Niraparib versus Paclitaxel-carboplatine-bevacizumab suivi d'une maintenance par Niraparib+bevacizumab chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire avancé après une chirurgie de cytoréduction initiale complète.		
OVAL-1	OVAIRE 	/
Étude de cohorte pan-européenne observationnelle, rétrospective décrivant l'utilisation de l'olaparib en monothérapie pour le traitement d'entretien des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire (satde FIGO III-IV) nouvellement diagnostiqué avec mutation des gènes BRCA.		
SALVOVAR	OVAIRE 	3
Essai pragmatique randomisé de phase III visant à évaluer l'utilité d'un ajustement de la dose et du schéma d'administration de la chimiothérapie chez les patientes dont le cancer de l'ovaire présente des caractéristiques défavorables en raison d'une faible chimiosensibilité de la tumeur et d'une chirurgie d'exérèse ne pouvant pas être complète A Pragmatic Randomized Phase III Trial to Assess the Utility of Adjusting Chemotherapy Dose & Dosing Schedule With the SALVage Weekly Dose-dense Regimen in Patients With Poor Prognostic OVARian Cancers Based on the Tumor Unfavorable Primary Chemosensitivity and Incomplete Debulking Surgery.		
TEDOVA	OVAIRE 	2
Étude de phase 2 randomisée comparant un traitement de maintenance par le vaccin OSE2101 (TEDOPI) composé de multiples néo-épitopes tumoraux, seul ou en association avec un anti PD1 (Pembrolizumab) par rapport au traitement standard chez des patientes présentant un cancer de l'ovaire en rechute sensible au platine.		
ALPHABET	SEIN 	3
Essai randomisé de phase III portant sur l'administration trastuzumab + Alpelisib +/- fulvestrant versus trastuzumab + chimiothérapie chez des patientes présentant une mutation PIK3CA et traitées préalablement pour un cancer avancé HER2+ «		
ALTERNATIVE	SEIN 	3
A randomized phase III study comparing the digitAL TElemonitoring platform Curety to usual standard of care in patients with tRiple NegAtive metastatic breast cancer initiating a firstline systemic treatment.		
ASCENT-03	SEIN 	3
Étude de phase III randomisée, menée en ouvert, comparant le sacituzumab govitécan au traitement de choix du médecin chez des patient(e)s atteint(e)s d'un cancer du sein triple négatif, non préalablement traité, localement avancé, inopérable ou métastatique, dont les tumeurs n'expriment pas PD-L1 ou chez des patient(e)s préalablement traité(e)s à un stade précoce avec des agents anti-PD-L1 et dont les tumeurs expriment PD-L1.		
ASCENT-04	SEIN 	3
Étude de phase III randomisée, menée en ouvert, visant à comparer l'association du SACITUZUMAB GOVITECAN et du PEMBROLIZUMAB à l'association du traitement de choix du médecin t du PEMBROLIZUMAB chez des patients atteints d'un cancer du sein triple négatif non préalablement traité, localement avancé, inopérable ou métastatique, dont les tumeurs expriment PD-L1.		
CAMBRIA-1	SEIN 	3
Étude de phase III, randomisée, en ouvert, visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité d'un traitement prolongé par camizestrant (AZD9833, un régulateur négatif sélectif oral du récepteur aux oestrogènes de nouvelle génération) par rapport à un traitement endocrinien standard (inhibiteur de l'aromatase ou tamoxifène) chez des patients atteints d'un cancer du sein précoce RE+/HER2- et présentant un risque intermédiaire ou élevé de récidive, ayant terminé leur traitement locorégional et ayant reçu au moins 2 ans de traitement endocrinien adjuvant standard sans récidive de la maladie.		

INVESTIGATION Oncologie gynécologique

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
CAMBRIA-2	SEIN 	3
Étude de phase III, randomisée et en ouvert visant à évaluer l'efficacité et la sécurité d'emploi du CAMIZSTRANT (AZD9833) par rapport à une thérapie endocrinienne standard (IA ou TAM) en tant que traitement adjuvant dans le cancer du sein précoce ER+/HER2-, présentant un risque de récurrence intermédiaire-élevé ou élevé, ayant reçu un traitement locorégional définitif et ne présentant aucun signe de maladie.		
COG-STIM2	SEIN 	RIPH2
Stimulation cognitive informatisée supervisée à distance visant à réduire les difficultés cognitives après chimiothérapie chez les femmes traitées pour un cancer du sein localisé : étude contrôlée randomisée multicentrique.		
DECRESCENDO	SEIN 	/
Désescalade de la chimiothérapie adjuvante chez des patients atteints d'un cancer du sein HER2+, à ER-nég/PR-nég, N0, de stade précoce, ayant obtenu une réponse pathologique complète après une chimiothérapie néoadjuvante et un double blocage HER2.		
DOMENICA	SEIN 	3
Étude de phase III comparant la chimiothérapie seule versus dostarlimab en première ligne chez les patients présentant un cancer de l'endomètre avancé ou métastatique, avec une anomalie de réparation de l'ADN (déficit MMR) : Étude DOMENICA (Étude GINECO/ENGOT).		
DREAM	SEIN 	/
Observational, Multicenter Retrospective Cohort Study Involving the Review of Medical Records to Describe the Clinical Characteristics, Treatment Patterns and Clinical Outcomes of Patients with HR+, HER2- Metastatic Breast Cancer in Recent Routine Clinical Practice in Europe.		
ELI-ABE-2021-01 PROTOCOLE [2018-7248]	SEIN 	/
Étude d'observation sur le cancer du sein HR+/HER2- Métastatique les patientes traités avec l'Abemaciclib. Exam des dossiers médicaux.		
EMBER-4	SEIN 	3
Randomized, Open-Label, Phase 3 Study of Adjuvant Imlunestrant vs Standard Adjuvant Endocrine Therapy in Patients who have Previously Received 2 to 5 years of Adjuvant Endocrine Therapy for ER+, HER2- Early Breast Cancer with an Increased Risk of Recurrence.		
EORTC2129	SEIN 	/
Élfacestrant pour le traitement des patients atteints d'un cancer du sein ER+/HER2- avec rechute selon l'ADNtc.		
FLAMINGO	SEIN 	3
A randomized, Multicenter, Placebo-controlled, Phase 3 study to Evaluate the Efficacy and Safety of HER2/neu Peptide GLSI-100 (GP2+ GM-CSF) in HER2/neu Positive Subjects with Residual Disease or High-Trastuzumab-based Therapy (FLAMINGO-01).		
GERICO	SEIN 	3
Adjuvant systemic treatment for oestrogen-receptor (ER)-positive HER2-negative breast carcinoma in women over 70 according to Genomic Grade (GG): chemotherapy + endocrine treatment versus endocrine treatment. A French UNICANCER Geriatric Oncology Groupe (GERICO) and Breast Group (UCBG) multicentre phase III trial.		
GREAT	SEIN 	/
Étude de cohorte pour évaluer les caractéristiques cliniques des patientes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire en fonction de la présence dans la tumeur d'une mutation BRCA ou d'anomalies génomiques et moléculaires au-delà de BRCA.		
HYPO G	SEIN 	3
Multicenter randomized phase III trial comparing hypo-fractionated versus standard radiotherapy in breast cancer with an indication for regional lymph node irradiation in terms of lymphedema occurrence.		
KADOR	SEIN 	4
Étude rétrospective française visant à décrire l'épidémiologie et la prise en charge thérapeutique des patientes présentant un cancer du sein précoce HER2+ ayant bénéficié d'un traitement néoadjuvant à base d'Herceptin.		
I3Y-MC-JPEF	SEIN 	3
Étude de phase III, randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo, visant à comparer l'efficacité de l'association abemaciclib-fulvestrant et de l'association placebo-fulvestrant chez des patients atteints d'un cancer du sein RH+, HER2-, avancé ou métastatique après une progression sous inhibiteur CDK4/6 et une hormonothérapie.		
IMPROVE	SEIN 	/
International Survey for Endometrial Cancer patients: perspective and expectation on therapy and quality of life.		
ISIDE	SEIN 	3B
Essai ouvert multicentrique et à bras unique de phase IIIB visant à évaluer la sécurité et l'efficacité du sacituzumab govitécan chez les patients présentant un cancer du sein triple négatif métastatique avec une analyse des biomarqueurs.		
LESS	SEIN 	2
Étude de désescalade de l'hormonothérapie adjuvante chez les femmes atteintes de cancer du sein RH+ HER2- à risque métastatique faible.		

INVESTIGATION Oncologie gynécologique

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
LIDERA - TRI0045-GO42784	SEIN 	3
Étude de phase III, multicentrique, randomisée, en ouvert, évaluant l'efficacité et la tolérance du giredestrant versus un traitement endocrinien en monothérapie au choix du médecin en situation adjuvante chez des patients atteints d'un cancer du sein précoce positifs aux récepteurs des oestrogènes (ER+) et HER2 négatif.		
MK-2870-010	SEIN 	3
Étude randomisée, en ouvert de phase III visant à évaluer le MK-2870 en monothérapie et en association avec le pembrolizumab versus le traitement au choix du médecin chez des participants atteints d'un cancer du sein HR+/HER2- localement avancé non résecable ou métastatique.		
NATALEE	SEIN 	3
Étude de phase III, multicentrique, randomisée, ouverte, évaluant l'efficacité et la tolérance du ribociclib associé à l'endocrinothérapie en tant que traitement adjuvant chez des patients atteints d'un cancer du sein précoce positif aux récepteurs hormonaux, HER2 négatif (New Adjuvant Trial with Ribociclib [LEE011] : NATALEE).		
ONCOHOME	SEIN 	/
Impact sur la qualité de vie de la prise en charge homéopathique en tant que soins de support dans le cancer du sein.		
PADA-1	SEIN 	3
Étude randomisée en ouvert de phase III évaluant la tolérance et l'efficacité du palbociclib en association avec une hormonothérapie dont la prescription est orientée par le suivi des mutations ESR1 de l'ADN tumoral circulant chez des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique avec des récepteurs aux oestrogènes positif et Her2 négatif.		
PALATINE	SEIN 	2
Advanced breast cancer: Therapy Integrating locoregional treatment in de novo, treatment naive, stage IV ER+, HER2- breast cancer patients receiving letrozole plus palbociclib.		
PETRA	SEIN 	/
Evaluation de la PFS à 6 mois chez des patientes atteintes de cancer du sein métastatique HER2+ et traitées par chimiothérapie associée au pertuzumab et à un biosimilaire du trastuzumab.		
REALITY01	SEIN 	/
Étude de l'impact de trastuzumab déruxécane en condition de vie réelle chez des patients souffrant de cancer du sein métastatique ou non résecable HER2+.		
REBECCA	SEIN 	/
Étude multicentrique nationale française chez des patients atteints d'un cancer du sein à un stade précoce.		
RIBOLARIS	SEIN 	2
Neoadjuvant and adjuvant RIBOciclib and endocrine therapy for cLinicAlly high-RISk estrogen receptor-positive (ER+) and HER2-negative (HER2-) breast cancer (RIBOLARIS).		
ROSALEE	SEIN 	/
Stratégies de traitement avec le ribociclib en vie réelle et résultats cliniques chez les femmes atteintes de cancer du sein HR+/HER2- avancé ou métastatique en France : étude nationale, multicentrique, prospective et non-interventionnelle.		
RXPONDER	SEIN 	3
Étude de phase III randomisée comparant une hormonothérapie adjuvante standard +/-chimiothérapie chez des patientes atteintes de cancer du sein localisé avec 1-3 N+, RH+ et Her2dont le score de rechute selon Oncotype DX™ est inférieur ou égal à 25.		
SAFIRO3	SEIN 	2
A randomised phase II trial comparing alpelisib to ribociclib combined with fulvestrant in patients presenting a ER+/Her2- metastatic breast cancer with persistent PIK3CA mutation detected on ctDNA after 1 month of treatment with fulvestrant combined with CDK4/6 inhibitor.		
SASCIA	SEIN 	3
Étude de phase III post-néoadjuvante évaluant le sacituzumab govitecan, conjugué Ac-médicament, chez des patients atteints d'un cancer du sein primitif HER négatif à risque élevé de récurrence après un traitement néoadjuvant standard.		
SILENCE	SEIN 	/
Étude de l'efficacité et de la tolérance d'une Stimulation vagale non invasive dans la prévention des nausées induites par la chimiothérapie par anthracycline et cyclophosphamide dans la prise en charge des cancers du sein, par une étude contrôlée, randomisée, multicentrique, en aveugle.		
TEDOVA	SEIN 	2
Essai de phase II randomisée, comparant un traitement de maintenance par le vaccin OSE2101 (TEDOPI®) seul ou en association avec Pembrolizumab par rapport au traitement standard chez les patientes présentant un cancer de l'ovaire en rechute sensible au platine.		
TRANSROSALEE	SEIN 	/
Étude translationnelle de profiling moléculaire à haut débit du cancer du sein RH+/HER2- métastatique traité par hormonothérapie et ribociclib.		

INVESTIGATION Oncologie gynécologique

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
TUC-TOC	SEIN 	2
Tucatinib en combinaison avec Etoposide Oral (VP16) et Trastuzumab chez les patients atteints de cancer du sein métastatique HER2 positif après progression sous Tucatinib-Capecitabine-Trastuzumab ou toxicité liée à la Capecitabine: une étude de phase II multicentrique.		
VITAL	SEIN 	/
Étude observationnelle multicentrique nationale longitudinale évaluant l'efficacité et la tolérance en vie réelle de TALZENNA® (talazoparib) chez les patients atteints d'un cancer du sein HER2 négatif localement avancé ou métastatique avec mutation somatique ou germinale de BRCA.		
DOMENICA	UTÉRUS 	3
Étude de phase III comparant la chimiothérapie seule versus dostarlimab en première ligne chez les patientes présentant un cancer de l'endomètre avancé ou métastatique, avec une anomalie de réparation de l'ADN (déficit MMR).		
IMPROVE	UTÉRUS 	/
IMPROVE – Enquête internationale portant sur les patientes atteintes de cancer de l'endomètre : perspectives et attentes concernant la prise en charge et la qualité de vie.		
MK2870 005	UTÉRUS 	3
Étude de phase III comparant le MK-2870 en monothérapie par rapport à un traitement du choix de l'investigateur chez des patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre ayant précédemment été traitées par chimiothérapie (platine et immunothérapie).		
MK-2870-020	UTÉRUS 	3
Étude multicentrique en ouvert de phase 3, randomisée, visant à comparer l'efficacité et la sécurité du MK-2870 en monothérapie versus le traitement au choix du médecin en deuxième intention pour les participantes atteintes d'un cancer du col de l'utérus récurrent ou métastatique.		
SGNTV-003	UTÉRUS 	3
Essai randomisé ouvert de phase 3 de Tisotumab Vedotin versus chimiothérapie au choix de l'investigateur dans le cancer du col de l'utérus récurrent ou métastatique de 2 ^e ou 3 ^e intention. BRCA.		
DS6000-19	APPAREIL GÉNITAL FÉMININ 	2/3
DS6000-109 : Étude de phase II/III multicentrique et randomisée portant sur le raludotatug déruxtécan (R-DXd), un conjugué anticorps-médicament dirigé contre la CDH6, chez des patientes atteintes d'un cancer péritonéal primitif, de l'ovaire ou des trompes de Fallope de haut grade et résistant au platine.		

INVESTIGATION ORL

AVEO ONCO - FIERCE HN	ORL 	3
Study of Ficlatusumab in Combination with Cetuximab in Subjects with Recurrent or Metastatic (R/M) HPV-Negative Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (FIERCE-HN).		
BROADEN	ORL 	/
Estimation de la fraction des cancers de la tête et du cou attribuables au Papillomavirus humain (VPH) par site anatomique, pendant deux périodes (2008-2009 et 2018-2019).		
BURAN - AN2025H0301	ORL 	3
Étude BURAN de buparlisib (AN2025) en association avec paclitaxel par rapport à paclitaxel seul, chez des patients atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou récurrent ou métastatique.		
NIVOPOSTOP	ORL 	3
Essai de phase III randomisé évaluant l'ajout de Nivolumab à l'association cisplatine-radiothérapie (traitement standard) dans le cancer épidermoïde de la tête et du cou localement avancé opéré à risque élevé de récidive.		
PEMBRORAD	ORL 	2
Étude de phase II randomisée évaluant la tolérance et l'efficacité du Pembrolizumab ou du Cétuximab en association avec un traitement par radiothérapie chez des patients atteints de carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou.		
PRONIHN	ORL 	/
A french, prospective, non-interventional research (nir) of nivolumab in patients with squamous cell carcinoma of the head and neck (scchn) progressing on or after platinum-based therapy.		
REACH	ORL 	3
Comparaison de l'association Avelumab cetuximab – RTE aux trtts standards.		
ROMANE	ORL 	/
Retrospective Observational study of patients with locally advanced squamous cell carcinoma of head and Neck.		

INVESTIGATION ORL

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
SMS-0499-1LN	ORL 	/
Profils de traitement, résultats cliniques, utilisation des ressources et résultats rapportés par les patients dans le traitement de 1ère ligne du carcinome épidermoïde récurrent / métastatique de la tête et du cou (1 L R / M SCCHN) chez des patients en Europe.		
STEREOPOSTOP	ORL 	2
Étude de phase II multicentrique. Evaluation de la toxicité tardive de la radiothérapie stéréotaxique hypofractionnée postopératoire des cancers localisés de l'oropharynx et de la cavité buccale avec marges à risque.		
TEMPORAL	ORL 	/
Étude prospective évaluant la valeur prédictive de la Tomographie par Emission de Positons au 18 FDG en cours de radio-chimiothérapie pour les carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou localement avancés.		
TOPNIVO	ORL 	2
Étude de tolérance du Nivolumab chez des Patients porteurs d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou (SCCHN), en rechute et/ou métastatique, et réfractaires aux sels de platine.		
TPEXTREME	ORL 	2
Randomized, controlled trial of Platinum-Cetuximab combined either with Docetaxel (TPEX) or with 5FU (Extreme) in patients with recurrent/metastatic squamous cell cancer of the head and neck.		
TRILYNX - DEBIO 1143-SCCHN-301	ORL 	3
A randomized, double-blind placebo-controlled, Phase 3 study of Debio 1143 in combination with platinum-based chemotherapy and standard fractionation intensity-modulated radiotherapy in patients with locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck, suitable for definitive chemoradiotherapy (TrilynX).		
XRAY VISION / MS202359_0002 / XEVINAPANT	ORL 	3
A randomized, double-blind, placebo-controlled, 2-arm Phase III study to assess efficacy and safety of xevinapant and radiotherapy compared to placebo and radiotherapy for demonstrating improvement of disease-free survival in participants with resected squamous cell carcinoma of the head and neck, who are at high risk for relapse and are ineligible for high-dose cisplatin.		
XXL	ORL 	3
A double-blind, randomized, Phase III study of radiotherapy combined with cetuximab + Xevinapant compared to radiotherapy combined with cetuximab (Standard of care) + placebo in patients with Locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck, unfit for high-dose cisplatin.		

INVESTIGATION urologique

7465-MA-3480	UROTHELIAL 	/
Étude non interventionnelle rétrospective et multicentrique reposant sur la collecte des données des patients que vous avez inclus entre juillet et décembre 2022 dans le cadre de l'Accès Précoce de l' enfortumab vedotin dans le traitement du cancer urothélial, localement avancé ou métastatique, en France.		
AVENANCE	UROTHELIAL 	/
A non-interventional study to provide real word data on the use of Avelumab as a maintenance treatment for patients with advanced or metastatic Urothelial Carcinoma.		
DISCUS	UROTHELIAL 	/
Comparaison 3 vs. 6 cycles de chimiothérapie à base de sels de platine avant un traitement d'entretien par l'avelumab dans le cancer urothélial à un stade avancé.		
IMMU-132-06 - TROPHY	UROTHELIAL 	2
A Phase II open label, study of IMMU-132 in metastatic urothelial cancer after failure of platinum-based regimen or anti-PD1-based immunotherapy.		
NEMIO	UROTHELIAL 	2
tude de phase I/II évaluant en NÉoadjuvant la chimiothérapie "ddMVAC" en association avec Durvalumab (MEDI4736) avec ou sans Tremelimumab dans le carcinome urothélial invasif.		
ORION	UROTHELIAL 	NON RIPH
Carcinome urothélial oligométastatique : cohorte rétrospective nationale française sur l'incidence, la prise en charge et les résultats cliniques.		
TROPICS-04 - IMMU 132-13	UROTHELIAL 	3
A Randomized Open-Label Phase III Study of Sacituzumab Govitecan versus Treatment of Physician's Choice in Subjects with Metastatic or Locally Advanced Unresectable Urothelial Cancer.		

INVESTIGATION urologique

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
URADJ - CA209-1416	UROTHELIAL 	/
Étude observationnelle ambispective chez des patients atteints de carcinome urothélial infiltrant le muscle, traités par nivolumab en situation adjuvante en France.		
ALADDIN	PROSTATE 	3
Evaluation of dAroLutamide Addition to anDrogen Deprivation therapy and radlatioN therapy in newly diagnosed prostate cancer with pelvic lymph nodes metastases.		
ARTEMISPRO	PROSTATE 	/
Prospective, Multi-Country, Observational Study of Clinical Outcomes for Patients With Metastatic Hormone Sensitive Prostate Cancer (mHSPC) Treated With ADT plus Apalutamide or Enzalutamide Under Routine Clinical Practice (ArtemisPRO).		
ATLAS	PROSTATE 	3
A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Phase 3 Study of JNJ-56021927 in Subjects with High-risk, Localized or Locally Advanced Prostate Cancer Receiving Treatment with Primary Radiation Therapy.		
ARTMIS	PROSTATE 	/
Étude multicentrique rétrospective des résultats cliniques chez des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique hormono-dépendant traités par apalutamide dans le cadre de la pratique clinique de référence (ArtemisR).		
CHECK-MATE - CA209-7DX	PROSTATE 	3
Étude de phase 3, randomisée, en double aveugle du nivolumab versus placebo en association avec le docétaxel, chez des hommes atteints d'un cancer métastatique de la prostate résistant à la castration (CheckMate 7DX : essai clinique Évaluation 7DX sur un point de contrôle et le nivolumab).		
CONTACT-02 - XL184-315	PROSTATE 	3
Phase 3, Randomized, Open-Label, Controlled Study of Cabozantinib (XL 184) in Combination with Atezolizumab vs Second Novel Hormonal Therapy(NHT) in Subjects with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer.		
DARIUS	PROSTATE 	2
DARolutamide And radiotherapy for patients with Intermediate Unfavorable riSk prostate cancer.		
DAROL	PROSTATE 	/
Darolutamide Observational Study in non-metastatic castration-resistant prostate cancer patients (étude observationnelle portant sur l'utilisation du darolutamide chez les patients atteints d'un cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration).		
EMBARK	PROSTATE 	3
A Phase 3, Randomized, Efficacy and Safety Study of Enzalutamide Plus Leuprolide, Enzalutamide Monotherapy, and Placebo Plus Leuprolide in Men With High-Risk Nonmetastatic Prostate Cancer Progressing After Definitive Therapy.		
GETUG 20	PROSTATE 	3
Étude de phase III randomisée évaluant le bénéfice d'un traitement hormonal adjuvant par leuproréline acétate (Eligard® 45 mg) pendant 24 mois après prostatectomie totale chez des patients à haut risque de récurrence.		
GETUG 21	PROSTATE 	3
Étude prospective de phase III, randomisée, d'évaluation de l'association d'un traitement hormonal avec ou sans radiothérapie avec ou sans abiraterone et prednisone chez les patients présentant un cancer de prostate métastatique hormono-naïf.		
GETUG 22	PROSTATE 	2
Étude de phase II randomisée multicentrique comparant l'efficacité d'une hormonothérapie courte concomitante à une radiothérapie versus une radiothérapie exclusive dans le traitement de rattrapage de patients présentant un PSA détectable après prostatectomie totale.		
GETUG 23	PROSTATE 	3
Étude de phase III, randomisée, d'évaluation du cabazitaxel et d'une radiothérapie pelvienne chez des patients présentant un cancer de prostate localisé à haut risque de rechute, selon un plan factoriel.		
GETUG P13 - POSTCARD	PROSTATE 	2
Étude randomisée de phase II, évaluant la radiothérapie stéréotaxique appliquée au corps entier (SBRT) avec ou sans Durvalumab (MEDI4736), chez des patients -porteur d'un cancer de la prostate hormono sensible en rechute oligométastatiques.		
GETUG AFU31	PROSTATE 	2
Étude de phase I/II multicentrique évaluant l'efficacité d'une ré-irradiation stéréotaxique chez des patients présentant une récurrence tumorale intra-prostatique après traitement par radiothérapie externe.		
GETUG-AFU-33 - CARLHA 2	PROSTATE 	3
Combined Apalutamide, Radiotherapy and LH-RH Agonist in high-risk post-prostatectomy biochemically relapsing prostate cancer patients.		

INVESTIGATION urologique

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
GETUG-AFU-36 - PRESTO	PROSTATE 	3
Prostate-cancer treatment using stereotactic radiotherapy for oligometastases ablation in hormone-sensitive patients - a GETUG phase III randomized controlled trial.		
IMPACT-IMP4297-202	PROSTATE 	2
Étude multicentrique de phase II, randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo évaluant un traitement d'entretien par senaparib après un traitement par docétaxel chez des patients atteints de CPRCm avec altérations des gènes impliqués dans la réparation par recombinaison homologue.		
MGC018-03 MACROGENICS - TAMARACK	PROSTATE 	2
Étude de phase 2, randomisée, en ouvert, visant à comparer deux niveaux de dose de vobramitamab duocarmazine chez des participants atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (TAMARACK).		
MGD019-02 MACROGENICS 2	PROSTATE 	2
Étude de phase 2, randomisée, en ouvert, portant sur le lorigerlimab en association avec le docétaxel ou sur le docétaxel administré seul chez des participants atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration.		
ODENZA	PROSTATE 	2
Étude de préférence des patients entre l'odm-201 et l'enzalutamide chez des hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration.		
OLIGOPELVIS	PROSTATE 	2
Étude multicentrique de phase II de radiothérapie à fortes doses et hormonothérapie dans les rechutes oligométastatiques ganglionnaires pelviennes de cancer de la prostate.		
OLIGOPELVIS 2	PROSTATE 	3
Étude randomisée de phase 3 évaluant le bénéfice de l'irradiation ganglionnaire pelvienne à forte dose couplée à une hormonothérapie intermittente pour les patients porteurs d'un cancer de prostate en rechute oligométastatique ganglionnaire pelvienne.		
OPALE	PROSTATE 	/
Observatoire des patients avec un adénocarcinome ProstAtique métastatique résistant à la castration et stratégies multi-LignEs.		
PEACE-6 - VULNERABLE	PROSTATE 	3
A randomized phase III trial evaluating the efficacy and safety of androgen deprivation therapy +/- darolutamide in frail men with castration-naïve de novo metastatic prostate cancer.		
PEACE-8 (GETUG-AFU-43)	PROSTATE 	3
Combination of darolutamide and stereotactic radiation therapy in patients with castration resistant prostate cancer and oligometastases on functional imaging.		
PROWESS	PROSTATE 	/
Prostate Olaparib real World Evidence Study : a French observational prospective multicenter study of adults patients treated in the real-life setting with Olaparib for the treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer.		
REEL - ELIGARD-LBR-NI-0570	PROSTATE 	/
Patients atteints d'un cancer de la prostate pour qui une immunothérapie par Eligard 22,5 mg ou 45 mg aura été initiée.		
RENAISSANCE	PROSTATE 	/
A multi-centre, non-interventional study of RELugolix as aNdrogen-deprivAtion therapy In patientS with advanced hormone-Sensitive prostate cANCer.		
REPAIR	PROSTATE 	2
Récidive en loge prostatique déjà irradiée : étude de phase I/II de ré-irradiation en conditions stéréotaxiques potentialisée par le Metformine.		
ROS_DARO/20321	PROSTATE 	3
Transfert des patients actuellement inclus dans l'étude 17777_ARASENS dans l'étude ROS_DARO/20321 -> Poursuite de leur traitement DAROLUTAMIDE.		
TALAPRO 3	PROSTATE 	3
Étude de phase 3, randomisée, en double aveugle, portant sur le talazoparib en association avec l'enzalutamide par rapport à un placebo en association avec l'enzalutamide chez des hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration avec mutation du gène ddr.		
TALISMAN	PROSTATE 	/
Treatment of aggressive prostate cancers in real life: initiation, schedule and management of triptorelin treatment.		

INVESTIGATION urologique

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
TRIPTO SWITCH - D-FR-52014-245	PROSTATE 	3
Étude multicentrique en ouvert, à un seul bras, évaluant l'efficacité et la sécurité de la formulation de triptoréline-6 mois administrée par voie sous-cutanée chez des participants atteints d'un cancer de la prostate localement avancé et/ou métastatique précédemment traité et castré avec un analogue de la GnRH.		
APOLON	REIN 	/
Étude Non Interventionnelle prospective de pazopanib chez les patients naïfs de toute thérapie anti-VEGF et traités pour un carcinome à cellules rénales avancé et/ou métastatique (Étude APOLON).		
AXIPRO	REIN 	2
Évaluation de l'intérêt d'un suivi par la web-application KidneyPRO par rapport au suivi standard pour les patients traités par axitinib/pembrolizumab en première ligne pour un cancer du rein avancé.		
CLIN-60000-452 - CABOCOMBO	REIN 	/
Prospective observational international study of cabozantinib tablets in combination with nivolumab as first-line treatment of advanced renal cell carcinoma in adults_265071.		
MK 6482 022	REIN 	3
Étude de phase III, multicentrique, en double aveugle, randomisée comparant l'efficacité et la sécurité d'emploi du belzutifan (MK-6482) plus pembrolizumab (MK-3475) versus placebo plus pembrolizumab, dans le traitement adjuvant du Carcinome Rénal à Cellules Claires (CRCC) post néphrectomie (MK-6482-022).		
TOPTACOS	REIN 	/
Tolérance et Observance des Patients traités par Thérapies AntiCancéreuses per OS.		
WITNESS	REIN 	/
Patients atteints d'un carcinome à cellules rénales avancé en deuxième ou troisième ligne de traitement et débutant la prise de nivolumab pour la première fois.		
WITNESS EXTENSION	REIN 	/
Patients atteints d'un carcinome à cellules rénales avancé en deuxième ou troisième ligne de traitement et débutant la prise de nivolumab pour la première fois.		
BLAD RAD - GETUG V07	VESSIE 	2
Consolidative radiotherapy for metastatic urothelial bladder cancer patients without progression and with no more than three residual metastatic lesions following first line systemic therapy : a prospective randomized comparative phase II trial.		
CREST - B8011006	VESSIE 	3
A Phase 3, Multinational, Randomized, Open-Label, Three Parallel-Arm Study of PF-06801591, an anti-PD-1 antibody, in Combination with Bacillus Calmette-Guerin (BCG Induction With or Without BCG Maintenance) Versus BCG (Induction and Maintenance) in Participants with High-Risk, BCG Naïve Non-Muscle Invasive Bladder Cancer.		
GETUG 30-BLADDER ART	VESSIE 	2
Radiothérapie adjuvante chez des patient atteint d'une tumeur de la vessie infiltrant le muscle à haut risque pathologique.		
SUNRISE 1 - TAR 200 - PROTOCOL 17000139BLC2001	VESSIE 	2B
Étude clinique de phase 2b évaluant l'efficacité et la sécurité d'emploi du TAR-200 en association au cé-trélimab, du TAR-200 seul ou du cé-trélimab seul chez les patients atteints d'une Tumeur de la Vessie n'infiltrant pas le Muscle (TVNIM) à haut risque non répondeur au Bacille de Calmette-Guérin (BCG) intravésical, inéligibles à une cystectomie totale ou la refusant.		
SUNRISE 2 - TAR 200 - PROTOCOL 17000139BLC3001	VESSIE 	3
Étude de phase 3, multicentrique, randomisée, évaluant l'efficacité du TAR-200 en association avec le cetrelimab par rapport à une chimioradiothérapie concomitante chez des patients atteints de Tumeur de Vessie Infiltrant le Muscle (TVIM), ne subissant pas de cystectomie radicale.		
THOR-2 - 42756493BLC2003	VESSIE 	2
Étude de phase II sur l'erdafitinib, un inhibiteur du récepteur du facteur de croissance des fibroblastes (FGFR), chez des patients atteints d'un cancer de la vessie à haut risque sans envahissement musculaire (HR-NMIBC) avec une mutation/fusion FGFR et ayant progressé ou en récidivé après un traitement par BCG (bacille Calmette-Guérin).		
VOLGA	VESSIE 	3
Étude de phase III, randomisée, multicentrique, en ouvert, visant à déterminer l'efficacité et la sécurité d'emploi du durvalumab en association au trémélimumab et à l'enfortumab védotin ou du durvalumab en association à l'enfortumab védotin dans le cadre d'un traitement périopératoire de la cystectomie radicale chez les patients inéligibles au cisplatine dans le cancer de la vessie infiltrant le muscle (VOLGA).		

INVESTIGATION thoracique

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
20190341	PNEUMOLOGIE 	3
Étude de phase III en ouvert, multicentrique, randomisée, visant à évaluer l'efficacité du sotorasib associé à un doublet de chimiothérapie à base de platine par rapport au pembrolizumab associé à un doublet de chimiothérapie à base de platine en première ligne, chez des patients atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules non épidermoïde de stade IV ou IIIB/C avancé, PD-L1 négatif et présentant la mutation KRAS p.G12C (CodeBreak 202).		
ARSENAL	PNEUMOLOGIE 	/
A French Real-life Study : Evaluation of durvALumab utilization and effectiveness for first line extensive stage small cell lung cancer.		
BGBC016	PNEUMOLOGIE 	1B/2
Étude de phase 1b/2a portant sur la sécurité d'emploi et la tolérance du bemcentinib en association avec le pembrolizumab/carboplatine/pémétréxed chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) non épidermoïde, avancé ou métastatique, non traité, sans/avec mutation du gène STK11 Protocole BGBC-016.		
GO41892 - CONTACT-01	PNEUMOLOGIE 	3
Étude de phase III, multicentrique, randomisée, en ouvert, contrôlée, destinée à évaluer l'efficacité, la tolérance et la pharmacocinétique de l'Atezolizumab administré en association avec le Cabozantinib versus le Docétaxel en onothérapie chez des patients présentant un cancer bronchique non à petites cellules métastatique précédemment traité par un anticorps anti-PD-L1/PD1 et une chimiothérapie à base de platine.		
IFCT-1905	PNEUMOLOGIE 	/
Evaluation et suivi des patients porteurs d'un cancer pulmonaire à petites cellules (CPC) traité par atezolizumab associé à de la chimiothérapie dans le cadre de l'ATU.		
KEYLYNK-012	PNEUMOLOGIE 	3
Étude de phase III comparant le Pembrolizumab concomitant avec une radiochimiothérapie suivie du Pembrolizumab avec ou sans Olaparib à une radiochimiothérapie suivie du Durvalumab chez les patients avec un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) de stade III, localement avancé et non résecable.		
MCLA-129	PNEUMOLOGIE 	1/2
Étude de phase 1/2 d'escalade de dose et d'extension évaluant le MCLA-129, un anticorps bispécifique humain anti-EGFR et anti-c-MET, chez des patients présentant une forme avancée du CPNPC (cancer du poumon non à petites cellules) et d'autres tumeurs solides.		
MESOIMMUNE	PNEUMOLOGIE 	/
Multicenter observational retrospective French study in patients with previously untreated, unresectable malignant pleural mesothelioma treated with nivolumab and ipilimumab via an early access program.		
NIRVANALUNG	PNEUMOLOGIE 	3
Étude de phase III évaluant l'ajout d'une RTE au traitement 2e ligne par antagoniste PD-1 ou PD-L1 chez les patients atteints d'un Cancer Bronchique non à Petites Cellules (CBNPC) de stade IIIB / IV		
PACIFIC-08	PNEUMOLOGIE 	3
A Phase 3, Randomized, Double blind, Placebo controlled, Multicentre, International Study of Durvalumab and Domvanalimab (AB154) as Sequential Therapy in Participants with Locally Advanced (Stage III), Unresectable Non-small Cell Lung Cancer Whose Disease has not Progressed Following Definitive, Platinum-based Concurrent Chemoradiation Therapy		
POSITHEs	PNEUMOLOGIE 	/
Étude de vraie vie - EGFRm+. Étude française, prospective, de vie réelle: collecter à long terme les données des patients EGFR mutés en 1 ^{re} ligne métastatique via un registre (tout traitement) et une cohorte (osimertinib uniquement).		
TROPION-LUNG 08	PNEUMOLOGIE 	3
Essai de phase 3, randomisé, en ouvert, portant sur Dato-DXd plus pembrolizumab vs pembrolizumab seul chez des patients naïfs de traitement atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé ou métastatique ayant un taux de PD-L1 élevé (SPT >=50 %) et ne présentant pas de modifications génomiques exploitables.		
TROPION-LUNG 07	PNEUMOLOGIE 	3
Essai de phase 3, randomisé portant sur le datopotamab deruxtecán (Dato-DXd) et le pembrolizumab, avec ou sans chimiothérapie à base de platine, chez des patients n'ayant pas reçu de traitement antérieur pour un cancer du poumon non à petites cellules non squameux avancé ou métastatique PD-L1 TPS < 50 % sans altérations génomiques actionnables.		

INVESTIGATION multipathologies

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
ACSE NIVOLUMAB	MULTIPATHOLOGIE	2
AcSé sécurisé au nivolumab pour des patients adultes porteurs de certains types de cancers rares		
COSMIC 021 - XL 184-021	MULTIPATHOLOGIE	1B
Étude de phase 1b avec escalade de dose portant sur le cabozantinib (XL184) administré seul ou en association avec l'atézolizumab chez des patients atteints de tumeurs solides localement avancées ou métastatiques		
EORTC 1811 - E2-RADIATE COHORTE OLIGOCARE	MULTIPATHOLOGIE	/
EORTC-ESTRO RADiotherapy InfrAstrucTure for Europe		
MOVE	MULTIPATHOLOGIE	/
décrire l'efficacité de moventig en situation réelle (avec ou sans prise associée de laxatifs) chez les patients atteints d'un cancer et présentant une constipation induite par les opioïdes		
OPTIMACURE	MULTIPATHOLOGIE	RIPH2
Bénéfice de la télésurveillance Cureety TechCare en complément des soins habituels au cours d'un traitement injectable contre le cancer : une étude française prospective, multicentrique, randomisée		
PACE	MULTIPATHOLOGIE	/
Pharmacoeconomy of Anemia in Cancer Evaluation Study		
SGNTV-001	MULTIPATHOLOGIE	2
Étude de phase 2, en ouvert, évaluant le Tisotumab Vedotin dans le traitement des tumeurs solides localement avancées ou métastatiques		
STEREO OS	MULTIPATHOLOGIE	3
Essai de phase III évaluant l'ajout d'une radiothérapie Stéréotaxique (SBRT) en complément du traitement standard chez les patients atteints d'une tumeur solide (cancer du sein, de la prostate et du poumon) entre 1 à 3 métastases osseuses.		
ZOSTER	SQUELETTE	3
Étude médico-économique multicentrique de phase III, randomisée, contrôlée, évaluant l'efficacité de l'ajout de l'acide Zolédronique ou du DENOSUMAB à la radiothérapie stéréotaxique dans le traitement des métastases vertébrales.		

INVESTIGATION hémathologie

AITIK	HÉMATOLOGIE 	/
AITIK : Arrêt de traitement par Inhibiteurs de Tyrosine Kinase dans la leucémie myéloïde chronique et impact sur le système immunitaire : étude comparative randomisée de deux stratégies thérapeutiques		
ALFA	HÉMATOLOGIE 	/
Evaluation de l'utilisation de Blenrep® chez des patients atteints de myélome multiple (initiation du traitement entre le 27/04/2020 et le 30/06/2021)		
APA²	HÉMATOLOGIE 	2
Étude de phase II, multicentrique, Evaluation de la faisabilité d'un programme d'activité physique adaptée chez les patients traités par une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques.		
ASSURE-3	HÉMATOLOGIE 	/
Scemblis® (asciminib) : étude prospective non interventionnelle chez des patients adultes atteints de LMC-PC traités en 3ème ligne ou plus en vie réelle en France		
ATU-NIVO	HÉMATOLOGIE 	/
Efficacité et sécurité du Nivolumab chez des patients atteint d'un lymphome de Hodgkin en rechute/réfractaire (R/R) traités dans le cadre d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU)		
AVAJAK	HÉMATOLOGIE 	3
Apixaban/rivaroxaban Versus Aspirine en prévention primaire des complications thromboemboliques des néoplasies myéloprolifératives mutées pour JAK2V617F		
AVENHIR	HÉMATOLOGIE 	2
Étude de phase II avec phase pilote de tolérance visant à évaluer le vénétoclax en association avec l'azacitidine chez des patients atteints de leucémies myélomonocytaires chroniques (LMMC) de risque intermédiaire ou élevé »		
BGB-11471-301	HÉMATOLOGIE 	3
Étude de phase III, en ouvert et randomisée, comparant le sonrotoclax (BGB-11417) associé au zanubrutinib (BGB-3111) par rapport au vénétoclax associé à l'obinutuzumab chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique non préalablement traitée		

INVESTIGATION hémathologie

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
CADENCE	HÉMATOLOGIE 	/
REGISTRE SUR LES AGGLUTININES : Cold Agglutinin Disease Real World Evidence Registry		
CARRISMM - IFM 2017-04	HÉMATOLOGIE 	/
Evaluation du risque de progression d'un myélome indolent (ou smoldering myeloma SMM) à un myélome multiple (MM) en appliquant les nouveaux critères IMWG		
CASSIOPEIA	HÉMATOLOGIE 	3
Étude du daratumumab (jnj-54767414 (HUMAX® CD38) en association avec le bortezomib(velcade), la thalidomide, et la dexaméthasone (VTD) en traitement de première ligne chez des patients atteints d'un myelome multiple nouvellement diagnostiqué et éligibles à une greffe		
CASSIOPEIA FOLLOW-UP	HÉMATOLOGIE 	/
CASSIOPEIA FU : Suivi à long terme des patients de CASSIOPEIA : le registre CASSIOPEIA Follow Up		
COMBOLA	HÉMATOLOGIE 	1/2
Étude multicentrique de phase I/II randomisée évaluant luspatercept seul ou en association avec l'ASE (Agents Stimulant l'Erythropoïèse) dans les Syndromes myélodysplasiques de faible risque non sidéoblastiques en échec ou non éligibles aux Agents Stimulants l'Erythropoïèse		
CONFIRM	HÉMATOLOGIE 	3
Étude multicentrique randomisée de phase III comparant un traitement continu d'une durée fixe avec le Daratumumab, Lénalidomide et Dexaméthasone dans le myélome multiple en rechute		
CONFIRM-MRD	HÉMATOLOGIE 	/
Prospective evaluation of the prognostic impact of measurable residual disease (MRD) within a phase III study comparing a fixed duration therapy versus continuous therapy with daratumumab, lenalidomide, and dexamethasone for relapsed multiple myeloma requiring a first salvage treatment		
DYSGLOBULINEMIE	HÉMATOLOGIE 	/
Recherche de facteurs génétiques prédisposant aux dysglobulinémies		
EMILY	HÉMATOLOGIE 	RIPH 2
Évaluation de l'impact de la surveillance électronique des événements rapportés par les patients sous traitement pour un lymphome diffus à grandes cellules B		
EMMY	HÉMATOLOGIE 	/
Épidémiologie de la prise en charge thérapeutique du myélome multiple en France		
EPCORE-FL2	HÉMATOLOGIE 	3
M22-003 : « Étude de phase 3, multicentrique, randomisée, en ouvert, visant à évaluer la sécurité et l'efficacité de l'Epcoritamab + Rituximab et Lénalidomide (R2) par rapport à une chimio-immunothérapie dans le lymphome folliculaire sans traitement antérieur (EPCORE™FL-2)		
ERADIC	HÉMATOLOGIE 	2
Évaluation d'une stratégie « adaptée » et conduite selon les résultats de la maladie résiduelle chez des patients présentant une LLC de risque intermédiaire au diagnostic sans comorbidités : étude de phase II comparant un traitement de référence de chimiothérapie par FCR à un traitement comportant une association de thérapies ciblées (venetoclax et ibrutinib)		
FAST (HÉMATO)	HÉMATOLOGIE 	2
Intérêt du maintien d'un traitement paraspirine chez les patients présentant une Thrombocytiémie essentielle de haut risque en réponse hématologique sous traitement cytoréducteur parHydroxyurée: Étude de non-infériorité ouverte, multicentrique et randomisée		
FILOBS_SÉRIEPROWM	HÉMATOLOGIE 	/
Constitution d'une série de validation des études pronostiques dédiées aux patients porteurs de Maladie de Waldenström : Validation d'un index pronostique international, évaluation de la survie sans progression comme critère de substitution de la survie globale		
FOLLOW	HÉMATOLOGIE 	/
FOLLOW - French Observational study of patients with chronic Lymphocytic Leukemia Or small lymphocytic lymphoma in real-World settings		
FREEDOM	HÉMATOLOGIE 	3
Essai multicentrique randomisée de phase III, schéma de traitement du myélome multiple en rechute/réfractaire sans dexaméthasone: un essai contrôlé, randomisé en ouvert, de non-infériorité.		
GFM-EPO-PRETAR	HÉMATOLOGIE 	3
Étude randomisée évaluant l'introduction précoce versus tardive de l'Epoétiine Alfa (EPREX®) chez les patients atteints de syndromes myélodysplasiques de bas risque.		
GLORA	HÉMATOLOGIE 	3
Étude internationale de phase 3, randomisée, en ouvert et multicentrique, portant sur le lisaftoclax (APG-2575) chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique/petit lymphome lymphocytaire précédemment traités.		

INVESTIGATION hémathologie

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
HLA 2024-01 LZM	HÉMATOLOGIE 	/
HLA 2023-01 Lymphome de la Zone Marginale Étude de vie réelle sur la prise en charge des patients atteints de Lymphome de la Zone Marginale en rechute.		
IDARA - IFM2018-02	HÉMATOLOGIE 	2
Étude Multicentrique Ouverte de Phase II de l'association Ixazomib – Daratumumab sans Dexaméthasone (IDara) Chez les Patients Agés atteints de Myélome Multiple en Rechute ou Réfractaire.		
IFM-2017-03	HÉMATOLOGIE 	3
Étude de phase III comparant le Lénalidomide et le Daratumumab en injection sous cutanée versus le Lénalidomide et la Dexaméthasone chez des sujets fragiles atteints de myélome multiple en traitement de première ligne et non éligibles à une chimiothérapie à forte dose.		
IFM-2020-05 - BENEFIT	HÉMATOLOGIE 	3
Étude de phase III, en ouvert, randomisée, de l'association isatuximab lénalidomide et dexaméthasone avec ou sans bortézomib chez les sujets âgés de 65 à 79 ans présentant un myélome multiple nouvellement diagnostiqué, non éligibles à l'autogreffe et non fragiles.		
KER-050 - ZZA45991/KEROS - MF050	HÉMATOLOGIE 	2
A Phase 2, Open-label, Ascending Dose Study of KER-050 for the Treatment of Anemia in Participants with Myelofibrosis (MF).		
LOTIS 5	HÉMATOLOGIE 	3
Étude randomisée de phase 3 visant à évaluer le LONCASTUXIMAB TESIRINE en association avec le RITUXIMAB par rapport à l'immuno-chimiothérapie chez des patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) en rechute ou réfractaire.		
MAGNETIS-MM-RW	HÉMATOLOGIE 	/
Étude multinationale, prospective, non interventionnelle sur la norme de soins des participants présentant un myélome multiple qui sont réfractaires à au moins 1 inhibiteur du protéasome, 1 médicament immunosuppresseur et 1 anticorps anti-CD38.		
MITHRIDATE	HÉMATOLOGIE 	/
Un essai randomisé international comparant Ruxolitinib à l'hydroxycarbamide ou l'interféron alpha comme traitement de première ligne des patients avec polyglobulie de Vaquez de haut risque.		
NAOS	HÉMATOLOGIE 	/
National Acalabrutinib Observational Study - Étude observationnelle multicentrique française sur l'utilisation de l'acalabrutinib dans le traitement des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique.		
PASS CC-5013-MM-034"	HÉMATOLOGIE 	/
A prospective non-interventional post-authorization safety study (PASS) of lenalidomide in previously untreated adult multiple myeloma patients who are not eligible for transplant ("transplant noneligible" [TNE]) ("Revlimid® TNE NDMM PASS").		
PHARAOM	HÉMATOLOGIE 	/
Impact d'un programme d'activité physique adaptée sur la survie sans événement chez des patients atteints d'un lymphome B diffus à grandes cellules traités en 1 ^{re} ligne.		
PREVENE	HÉMATOLOGIE 	2
Traitement préemptif par Vénétoclax pour les patients atteints d'une LLC de stade A de haut risque, une étude de phase II.		
REALITY WW	HÉMATOLOGIE 	/
Étude de cohorte prospective avec traitement de première intention par Ibrutinib + vénétoclax (I+V) à durée fixe chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique dans le contexte de la pratique.		
REGISTRE MDS	HÉMATOLOGIE 	/
Observatoire des syndromes myelodysplasiques et des leucémies secondaires chimio- et radio-induites des centres du gfm.		
SLP RARES	HÉMATOLOGIE 	RIPH2
Rôle pronostique de l'ADN tumoral circulant évalué après 6 mois de traitement, dans la maladie de Waldenström.		
SLP RARES HVISC	HÉMATOLOGIE 	RIPH2
Étude clinique du syndrome d'hyperviscosité dans la Maladie de Waldenström, une étude du Réseau de prise en charge clinique et d'études translationnelles longitudinales des hémopathies lymphoïdes chroniques B indolentes rares.		
SPACE -2	HÉMATOLOGIE 	/
Evaluation de la proportion de patients présentant une sarcopénie au diagnostic pour des patients atteints d'un cancer métastatique ou d'une hémopathie maligne non précédemment traité.		
STAIR-FILOCC14	HÉMATOLOGIE 	RIPH1
STop and restart Acalabrutinib In fRail patients with previously untreated CLL.		

INVESTIGATION hémathologie

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
SYMPHONY-1	HÉMATOLOGIE 	1B/3
Étude de phase 1b/3 randomisée, en double aveugle, en 3 étapes avec design adaptatif selon biomarqueur, du tazémétostat ou placebo en association au lénalidomide et rituximab chez des patients atteints d'un lymphome folliculaire en rechute ou réfractaire.		
TAK-771-5006	HÉMATOLOGIE 	/
Étude prospective observationnelle visant à évaluer l'utilisation et les résultats en conditions réelles de HyQvia chez des patients atteints de myélome multiple (MM) ayant reçu un diagnostic d'immunodéficience secondaire (IDS).		
TRANSCRIPT	HÉMATOLOGIE 	/
Transplantation après réponse complète chez les patients atteints de lymphome T périphérique.		
VALYM	HÉMATOLOGIE 	2
Étude de phase II en ouvert évaluant le valemétostat tosylate en monothérapie chez des patients atteints d'un lymphome à cellules B en rechute ou réfractaire.		
VERONE	HÉMATOLOGIE 	/
Efficacité et prise en charge thérapeutique de la leucémie lymphoïde chronique par Venetoclax en situation réelle.		
WMR-BENDA FILO	HÉMATOLOGIE 	/
Analyse rétrospective de la prise en charge d'une maladie de Waldenström en première ligne par une chimiothérapie de type Rituximab-Bendamustine.		
HLA -REGISTRE VAQUEZ	HÉMATOLOGIE 	/
Registre HLA.		

INVESTIGATION Autres spécialités

1302-T-HIPLTO-RM	ORTHOPÉDIE 	/
Multicentric Observational PMCF Study to Evaluate Long-Term Outcome, Performance, and Safety of Implantable Devices in Hip Arthroplasty.		
ABALONE	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Hospitalisation en ambulatoire des patients isolés à domicile pour le traitement de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs par technique endovasculaire: essai randomisé en grappes.		
ALGOSFAR 2	ANESTHÉSIE	RNIPH
Prise en charge de la douleur postopératoire en France : une étude prospective nationale.		
ALLERGAN	OPHTALMO 	/
Étude comparative entre le bimatoprost LP et la trabéculoplastie sélective au laser dans le traitement de patients atteints du glaucome à angle ouvert ou de l'hypertension intraoculaire.		
AMUNDSEN	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Acute Myocardial infarction Upbound to percutaneous coronary intervention, immediately (STEMI) or in the Next three Days (NSTEMI), and randomized to Subcutaneous Evolocumab or Normal strategies to reach guidelines LDL objectives in the real-world.		
ANCHOR	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	RIPH 2
ECMO veino-artérielle pour la prise en charge des infarctus du myocarde compliqués de choc cardiogénique.		
ARCACHON	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Assessment in a Randomized Controlled trial of Adverse outcome in asymptomatic patients with prior Coronary revascularization who Have a systematic stress testing strategy Or a Non-testing strategy during long-term follow-up: The ARCACHON study.		
ARNASA - GB44332	PNEUMOLOGIE 	3
A phase III randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study to evaluate the efficacy and safety of ASTEGOLIMAB in patients with chronic obstructive pulmonary disease.		
BALTIC	ORTHOPÉDIE 	/
Résultats à long terme de la butée acromiale pédiculée selon Kouvalchouk pour le traitement de l'instabilité chronique postérieure d'épaule.		
BESURE	BARIATRIQUE 	/
Chirurgie bariatrique avec cure prothétique de hernie antérieure de l'abdomen : essai randomisé contrôlé.		
BIO4AMB	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Essai multicentrique, contrôlé, comparant les accès fémoraux réalisés en 4 French par rapport au 6 French pour le traitement endovasculaire en ambulatoire des maladies artérielles périphériques des extrémités inférieures.		

INVESTIGATION Autres spécialités

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
BIOFLOW-VIII	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
SaFeTy and performance Registry for an aLL-comers subject population with the Limus Eluting Orsiro Mission Stent System Within daily clinical practice - VIII.		
BIO OEDIPE.CRT-P	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
One Day Implantation Program for Heart Failure Patients Implanted With BIOTRONIK Cardiac Resynchronization Therapy Pacemakers.		
BIO STREAM.HF	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Observation de la pratique courante des patients insuffisants cardiaques implantés avec des dispositifs CRT BIOTRONIK.		
BIPAC	ANESTHÉSIE	NON RIPH
Patients and physicians' biased behaviors during pre-anesthesia consultation, prevalence and consequences in a prospective study.		
BIPASS	BARIATRIQUE 	/
Prospective multicentric randomized trial comparing the efficacy and safety of Sleeve Gastrectomy with Transit Bipartition (SG+TB) versus Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGB).		
CALIPSO	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Guidage OCT de l'angioplastie des lésions calcifiées.		
CAPNEUCHIM	DOULEUR	/
Patch de capsaïcine 179 mg versus duloxétine dans le traitement des neuropathies périphériques chimio-induites : une étude randomisée de phase 3 multicentrique en ouvert.		
CAPSACOX	DOULEUR	3
Phase 3 confirmatoire, randomisée 1:1 en double aveugle, contrôlée contre placebo évaluant l'efficacité antalgique des patchs Capsaïcine 8% dans les Coccygodynies chroniques.		
CELEBRITY	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Observatoire multicentre évaluant le stent coronaire VIVO ISAR sans polymère à élution médicamenteuse de Sirolimus en pratique clinique de routine.		
CICAMODA RISK	GYNÉCO 	/
Étude ancillaire sur la perception du risque associée au mode d'accouchement (CICAMODA Risk).		
CICASCAP	ORTHOPÉDIE 	/
Étude du résultat fonctionnel de la réinsertion du sous scapulaire dans les prothèses inversées d'épaule en fonction de la cicatrisation du sous scapulaire.		
CIRENDO	GYNÉCO 	/
The North-West Inter Regional Female Cohort for Patients With Endometriosis.		
COMFORT	ANESTHÉSIE	/
RIPH 2Effet comparé d'une échelle de confort et d'une échelle numérique de douleur sur la consommation d'opiacés en salle de surveillance post-interventionnelle.		
COROSCAN-IA	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
COROScan-IA : Classification automatique anatomique et fonctionnelle des artères en scanner coronaire par Intelligence Artificielle.		
CROHN-PREP	DIGESTIF 	/
Préparation intestinale simplifiée adaptée à la vidéo-capsule endoscopique de l'intestin grêle chez des patients atteints de maladie de Crohn ; comparaison avec la méthode de référence. Étude prospective, randomisée, contrôlée, multicentrique.		
CRUZ-SENIOR	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Registre post-commercialisation pour évaluer la sécurité et l'efficacité du système d'endoprothèse coronaire (stent) Supraflex au sirolimus dans le traitement d'une cohorte de patients octo- et nonagénaires atteints de maladie coronarienne.		
DAI PP2	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Observatoire multicentrique français des porteurs de Défibrillateur Automatique Implantable.		
DEFETOSE	GYNÉCO 	RIPH 2
Étude randomisée du transfert embryonnaire différé versus fnis dans une population de patientes infertiles en FIVICSI (DEFETOSEi - DEFETOSE).		
ELIS	ORTHOPÉDIE 	/
Évaluation du résultat à long terme de la ligamentoplastie dorsale renforcée par internal-brace dans le traitement de l'instabilité scapho-lunaire.		

INVESTIGATION Autres spécialités

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
EMIBICI	GYNÉCO/OBSTETRIQUE 	PHRC
Étiologies de la Mort Fœtale in Utéro: performances diagnostiques du bilan minimal ciblé versus systématique.		
EMOUVOIR-1902	GYNÉCO/SEIN 	3
Essai randomisé évaluant l'impact d'un accompagnement personnalisé et à distance portant sur l'activité physique et sportive auprès- de patientes dans l'après-cancer du sein.		
EPATPAC	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Evaluation de Bliss DTx lors d'un parcours de soins incluant la pose d'une Chambre à Cathéter Implantable.		
EPIS-AKI	ANESTHÉSIE	/
Étude observationnelle sur l'insuffisance rénale postopératoire en chirurgie majeure.		
ESCAPE	ORTHOPÉDIE 	/
Évaluation de la Conservation Spinale par Procédures Endoscopiques pour Éviter la Fusion.		
ESPRIT	ANESTHÉSIE	/
Enquête nationale de pratique sur la prise en charge de la sédation-analgésie, des troubles dépressifs et de l'inconfort en réanimation.		
FARADISE	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Collecte de données de vie réelle auprès de sujets traités avec le système d'ablation par champ électrique pulsé FARAPULSE™.		
FAST (GASTRO)	DIGESTIF 	/
Identification de Facteurs Associés à un reTard diagnostic au cours de la maladie de Crohn : étude FAST.		
FIXAKIN	ORTHOPÉDIE 	/
Étude sur l'ostéotomie d'akin: fixation versus non fixation.		
FRANCE LILI	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Étude prospective, non interventionnelle, observationnelle, multicentrique, à un seul bras évaluant le système de Lithotripsie coronaire C2 Shockwave Medical dans l'angioplastie des artères coronaires en France chez des patients « tout venants ».		
FRANCE REDUCER	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Étude observationnelle sur les réducteurs de sinus indiqué dans l'angine de poitrine stable réfractaire.		
FREEDOM OP	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	RIPH2
Évaluation de la faisabilité de la prise en charge en ambulatoire avec compression manuelle des patients traités pour une AOMI par technique endovasculaire avec ponction fémorale en 5F.		
FX_PROTOCOL_CL_21-02	ORTHOPÉDIE 	/
Post Market Clinical Follow-up Study for Arthroplasty Shoulder System of FX Solutions at the long-term.		
GANEA 3	GYNÉCO/SEIN 	/
Ganglion sentinelle après chimiothérapie neoadjuvante dans le cancer du sein.		
GSK3511294	PNEUMOLOGIE 	/
Étude de 52 semaines de non-infériorité, randomisée, en double aveugle, avec double placebo, en groupes parallèles, multicentrique, évaluant le taux d'exacerbation, le contrôle de l'asthme et la sécurité d'emploi chez des patients adultes et adolescents atteints d'asthme sévère présentant un phénotype éosinophilique et traités par GSK3511294, par rapport au traitement par mepolizumab ou benralizumab.		
HEAR	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Healthcare European Amyloidosis Registry.		
HEARTLOGIC FRANCE	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Suivi des patients insuffisants cardiaques porteurs d'un défibrillateur cardiaque implantable doté de l'algorithme HeartLogic.		
HIP	ORTHOPÉDIE 	/
Validation transculturelle et psychométrique des scores SUSHI et HOOS-12 chez les patients atteints de pathologies coxo-fémorales.		
ICARE	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Lithotripsie intravasculaire en comparaison de l'athérectomie rotative évaluée par OFDI.		
INCISOX	DIGESTIF 	/
Surgical treatment of large incisional hernia with botulinum toxin A injection: a double-blind randomized controlled trial.		

INVESTIGATION Autres spécialités

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
INVESTIG - ETC2021-001	ANESTHÉSIE	NON RIPH
Étude des performances de filtration du dispositif i-SEP dans le traitement de sang récupéré en chirurgie.		
ETC 2021-001- ÉTUDE INVESTIG"i-TRANSEP	ANESTHÉSIE	/
Étude clinique prospective, multicentrique, simple bras évaluant la sécurité, la performance et le bénéfice clinique d'un nouveau dispositif.		
LOADEX	OPHTALMO 	/
Étude pilote évaluant l'efficacité d'un protocole de traitement avec injection en dose de charge d'un implant de dexaméthasone chez des patients présentant un œdème maculaire diabétique.		
MAPAM01	GYNÉCO/SEIN 	/
Mastectomie thérapeutique avec conservation de l'étui cutané et de la plaque aréolo-mamelonnaire.		
MOVESTAR	ORTHOPÉDIE 	3
Étude de l'efficacité et de la tolérance du dispositif médical B-Dyn comparé à une fusion classique vissée avec ou sans cage dans le traitement de la sténose lombaire dégénérative, avec ou sans spondylolisthésis de grade I sur le degré d'incapacité fonctionnelle post opératoire, la conservation de la mobilité et la prévention du syndrome adjacent.		
NEOVAB	GYNÉCO/SEIN 	/
Prospective multicenter pilot study to evaluate the accuracy of percutaneous biopsy by vacuum-assisted biopsy (VAB) to assess pathological complete response in patients with clinical and radiological complete response after neoadjuvant chemotherapy (NAC).		
OCEANIC AF	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	3
Étude de phase III internationale, randomisée, multicentrique, contrôlée par comparateur actif, en double aveugle, double placebo, en groupe parallèle, ayant pour objectif d'évaluer l'efficacité et la tolérance de l'asundexian (BAY 2433334), un inhibiteur oral du Facteur XIa (FXIa), comparativement à l'apixaban dans la prévention de l'accident vasculaire cérébral (AVC) ou de l'embolie systémique chez des patients masculins et féminins âgés de 18 ans et plus, présentant une fibrillation atriale (FA) à risque d'AVC.		
OCTA	OPHTALMO 	RIPH2
L'OCT Angiographie dans le diagnostic du glaucome : une étude multicentrique.		
OCTOPUS	OPHTALMO 	3
Étude multicentrique, en ouvert, sur un an, avec un bras traitement, évaluant l'efficacité anatomique de brolocizumab à l'OCT-A chez des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire (OCTOPUS).		
OMEGA 10	BARIATRIQUE 	/
Évaluation des effets indésirables à long terme du gastric bypass en omega.		
OPALINE	ENDOCRINOLOGIE	/
Impact de l'utilisation d'une pOmPe À insuLine sur la qualité de vie de patients diabétiques de type 1 Naïfs de pompe.		
OPRICA	ORTHOPÉDIE 	/
Optimisation de la préparation cutanée pour réduire la colonisation à Cutibacterium acnes dans des prélèvements superficiels et profonds lors de la chirurgie prothétique de l'épaule chez l'homme.		
OVAMI-ARN	GYNÉCO 	/
Évaluation des miARN salivaires devant une masse annexielle d'origine ovarienne.		
PC-ARN	UROLOGIE/PROSTATE 	2
Surveillance active avec ou sans traitement de 6 mois par Apalutamide dans le cancer de la prostate de bas risque : une étude multicentrique de phase II randomisée.		
PHENIX	NEURO	/
Hizentra® dans les neuropathies inflammatoires - Étude pHeNix (pHeNix) - étude nationale prospective multicentrique non interventionnelle.		
PINHAR	ORTHOPÉDIE 	RIPH2
Comparaison des effets de deux concentrations d'adrénaline (0.33 mg/l vs 1 mg/l) dans le serum d'irrigation de la chirurgie arthroscopique de l'épaule.		
PNEUMOCOVID	PNEUMOLOGIE 	/
Cohorte épidémiologique nationale collaborative pneumologique d'évaluation des séquelles respiratoires : metacohorte pneumocovid, pi2021_843_0135.		
POMPBIARIATRICDT1	ENDOCRINOLOGIE 	HORS LOI JARDÉ
Pompe à insuline en boucle fermée ou "pancréas artificiel" chez les patients vivant avec un diabète de type 1 en situation d'obésité et ayant bénéficié d'une chirurgie bariatrique.		
PRECAFOET	GYNÉCO/OBSTETRIQUE 	PHRC
Détection précoce des maladies cardiaques graves chez les fœtus à haut risque cardiaque.		

INVESTIGATION Autres spécialités

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
PRECISURG	BARIATRIQUE 	/
Effet de l'allongement de l'anse alimentaire ou de l'anse biliaire sur le taux de rémission du diabète de type 2 après gastric bypass chez le patient obèse sévère - Essai clinique contrôlé, multicentrique, randomisé.		
PRETTI01/2021	CHIRURGIE DIGESTIVE 	/
Safety and Efficacy of the Enfomina® triangulation platform for treating patients requiring endoscopic suturing of gastrointestinal wall.		
PROPHYLOXITIN	ANESTHÉSIE	3
Administration intermittente de céfoxitine versus bolus suivi d'une perfusion continue dans la prévention des infections du site opératoire dans la chirurgie colorectale : étude multicentrique, en double aveugle, randomisée contrôlée.		
PSR/MICRA/SLS	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Product Surveillance Registry.		
RAFPAN2	UROLOGIE/PANCRÉAS 	/
Étude de cohorte longitudinale, prospective, française, multicentrique sur la radiofréquence pancréatique.		
REFORCE	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Registre Français évaluant la sécurité et l'efficacité du système d'athérectomie ORbitale coronaire Diamondback 360™ dans la préparation des lésions Coronaires calcifiées avant implantation d'une Endoprothèse coronaire.		
REGISTRE FRANCE PCI	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Observatoire national de cardiologie interventionnelle.		
REGUL-AIPM	GYNÉCO 	/
Accouchement Inopiné Extra hospitalier en SMUR.		
REPAIR	UROLOGIE 	/
Utilisation en vie réelle des implants de renfort Restorelle® dans la prise en charge chirurgicale du prolapsus apical par voie abdominale : une étude clinique observationnelle post-commercialisation.		
RIGHTCOLOCALCIF	CHIRURGIE DIGESTIVE 	/
Évaluation d'un score de calcification artérielle comme facteur prédictif de fistule anastomotique dans la colectomie droite. Étude RIGHTCO-LOCALCIF. Étude multicentrique prospective non randomisée.		
SADISLEEVE	BARIATRIQUE 	/
Étude prospective, multicentrique, randomisée, contrôlée de l'efficacité et de la sécurité du Bypass duodéno iléal avec sleeve gastrectomy (Single Anastomosis Duodéno Iléal bypass with sleeve gastrectomy (SADI-S)) versus Bypass gastrique Roux-en-Y (RYGB).		
SENTICOL III	GYNÉCO/UTERUS 	/
Étude internationale de validation de la biopsie du ganglion sentinelle dans le cancer précoce du col utérin.		
SOAP	UROLOGIE/PROSTATE 	/
Étude multicentrique randomisée en ouvert visant à montrer la non-infériorité du risque de complication lors du maintien de l'anticoagulation orale dans la chirurgie de l'hyperplasie bénigne de la prostate par photovaporisation laser.		
SOS OXYGENE	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Prévalence du syndrome obésité-hypoventilation chez des patients qui présentent un syndrome métabolique.		
SWIFT	OPHTALMO	/
Étude sur le brolucizumab chez des patients adultes atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire contrôlée anatomiquement sous-optimale.		
SYMBOL_STEM_09	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Étude prospective, de suivi clinique après commercialisation, pour l'évaluation de la performance et de la sécurité des prothèses de la gamme Symbol Stem.		
TAXIO	PNEUMOLOGIE 	2
Étude de phase II évaluant l'efficacité d'une chimiothérapie sans étoposide associée au durvalumab (MEDI4736) dans le traitement de première ligne du cancer bronchique à petites cellules (CBPC) de stade étendu.		
THYROVIR	ORL 	RIPH2
Intérêt du casque de réalité virtuelle dans la gestion du stress péri-opératoire chez les patients candidats à une thyroïdectomie totale.		

INVESTIGATION Autres spécialités

ÉTUDE	LOCALISATION	PHASE/CATÉGORIE
TKAFTER	ANESTHÉSIE	/
Douleur chronique et pronostic fonctionnel après prothèse totale de genou (PTG) : analgésie locorégionale continue par cathéter au triangle fémoral versus infiltration tissulaire dans le cadre d'une démarche de réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC).		
TRANSFORM II	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Sirolimus-coated Balloon Versus Drug-eluting Stent in Native Coronary Vessels.		
TREASURE	DIGESTIF 	/
Étude de la satisfaction et de l'efficacité du traitement par Ustekinumab chez les patients ayant une maladie inflammatoire chronique de l'intestin : étude en vie réelle sur 12 mois.		
TVNIM	UROLOGIE 	/
Registre AFU de la prise en charge thérapeutique et du suivi des TVNIM.		
VAPEUR-RCT	UROLOGIE/PROSTATE 	/
Traitement par vapeur d'eau vs. traitement pharmacologique par bithérapie pour le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate symptomatique réfractaire à une monothérapie par alpha-bloquant chez des hommes sexuellement actifs : une étude multicentrique, contrôlée et randomisée.		
VELODROME	OPHTALMO 	3B
Étude de phase IIIb, internationale, multicentrique, randomisée, en insu pour l'évaluation visuelle, évaluant l'efficacité, la sécurité d'emploi et la pharmacocinétique d'un schéma de recharge toutes les 36 semaines du dispositif de relargage (Port Delivery System) du ranibizumab chez des patients atteints de dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge.		
VIGIMESH	UROLOGIE 	/
Observatoire des complications après chirurgie de l'incontinence urinaire ou du prolapsus génital ou rectal chez la femme.		
WEEK'ALR	ANESTHÉSIE	/
Évaluation de l'utilisation de l'analgésie locorégionale en réanimation : Étude multicentrique prospective observationnelle.		
YUCHOOSER	CARDIOLOGIE-VASCULAIRE 	/
Observatoire multicentrique évaluant les endoprothèses coronaires Yukon Choice PC et Yukon Chrome PC avec polymère biorésorbable à libération de Sirolimus en pratique clinique de routine.		

PROMOTION Essais cliniques

ÉTUDE	PROMOTEUR LOCALISATION	COORDONNATEUR/CENTRE ASSOCIÉ RIPH
ARG-BP	LES HÔPITAUX PRIVÉS RENNAIS - SAINT-GRÉGOIRE MONOCENTRIQUE HORS-ONCO BARIATRIQUE	DR STERKERS RIPH 1
Il s'agit d'une étude prospective, ouverte, randomisée, mono-centrique, portant sur la comparaison en terme d'efficacité et de sécurité de l'association Coagulation au Plasma Argon (APC) par voie endoscopique + prise en charge nutritionnelle versus prise en charge nutritionnelle seule dans les reprises de poids après gastrique by-pass.		
BIOHACK	CLINIQUE GÉNÉRALE ANNECY MONOCENTRIQUE HORS-ONCO ORTHOPÉDIQUE	DR BUIZJE RIPH 2
Effet de la biomodulation sur la cicatrisation des tendons après réparation de la coiffe des rotateurs. Etude interventionnelle de catégorie 2, randomisée monocentrique prospective.		
BIOMAKA	CLINIQUE DU SPORT - BORDEAUX MÉRIGNAC MONOCENTRIQUE HORS-ONCO ORTHOPÉDIQUE	DR RIVIERE RIPH 2
Prothèse Totale De Genou Alignée Mécaniquement Ou Cinématiquement : Étude Prospective Et Comparative Des Résultats Cliniques, Stéréoradiographiques, Et Biomécaniques.		
C3PO	CLINIQUE GÉNÉRALE ANNECY MONOCENTRIQUE HORS-ONCO ORTHOPÉDIQUE	DR BUIZJE RIPH 2
Cutibacterium acnes: Triple Prevention in shoulder Operations.		
COMPOSITE	CLINIQUE DU SPORT - BORDEAUX MÉRIGNAC MONOCENTRIQUE HORS-ONCO ORTHOPÉDIQUE	DR CORDIER RIPH2
La réalisation d'un test composite à 4 mois post-opératoire permet-il de diminuer le risque d'échec après ligamentoplastie latérale de cheville ?		

PROMOTION Essais cliniques

ÉTUDE	PROMOTEUR LOCALISATION	COORDONNATEUR/CENTRE ASSOCIÉ RIPH
ELIOS	HÔPITAL PRIVÉ DE LA BAIE - AVRANCHES MONOCENTRIQUE HORS-ONCO OPHTHALMO	DR MIGUEL RIPH 2
Efficacité et sécurité du laser ELIOS dans la chirurgie du glaucome.		
EMMA	L'HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT MULTICENTRIQUE ONCOLOGIE HEMATO	DR LE DU RIPH 2
Évaluation de l'impact d'un suivi électronique sur l'observance thérapeutique en hématologie.		
HYP_HEM	LES HÔPITAUX PRIVÉS RENNAIS - CESSON-SÉVIGNÉ MONOCENTRIQUE ONCOLOGIE HEMATO	DR DONCKER RIPH 2
Hypnose en réalité virtuelle chez des patients en situation d'isolement protecteur pour aplasie en Hématologie clinique. Étude monocentrique, comparative, randomisée, ouverte.		
HYPPROMET	LES HÔPITAUX PRIVÉS RENNAIS - SAINT-GRÉGOIRE MULTICENTRIQUE FRANCE + PORTUGAL ONCOLOGIE UROLOGIE/PROSTATE	DR ARTIGNAN RIPH2
Évaluation de l'Hypnose en réalité virtuelle sur l'anxiété des patients atteints d'un cancer de Prostate Metastatique au décours de la chimiothérapie - Etude monocentrique, comparative, randomisée, ouverte.		
KAOR	CLINIQUE DU SPORT - BORDEAUX MÉRIGNAC MONOCENTRIQUE HORS-ONCO ORTHOPEDIQUE	DR RIVIERE RIPH2
Étude prospective randomisée comparant les prothèses SpheriKA® (MEDACTA) et Origin® (SYMBIOS) lors de la pose d'une prothèse totale de genou par technique d'alignement cinématique (KAOR).		
KF23	CLINIQUE SAINT-FRANÇOIS - NICE MONOCENTRIQUE HORS-ONCO ORTHOPEDIQUE	DR DREANT RIPH2
Prospective study of arthrodesis of finger distal interphalangeal joints using the Kerifuse device.		
KHAVECOMPRESION	CHP BREST PASTEUR - BREST MULTICENTRIQUE HORS-ONCO ORTHOPEDIQUE	DR GERARD RIPH2
Les bas de contention sont-ils toujours nécessaires dans les programmes de réhabilitation améliorée après chirurgie prothétique de hanche et de genou ?		
MATASI-L	CLINIQUE GÉNÉRALE ANNECY MONOCENTRIQUE HORS-ONCO ORTHOPEDIQUE	DR BUIZJE RIPH 2
Multifactorial Approach Training for Anterior Shoulder Instability after a Latarjet procedure: a randomized controlled trial (MATASI-L).		
MESOCOLO	POLYCLINIQUE DE L'EUROPE - SAINT-NAZAIRE MONOCENTRIQUE HORS-ONCO DIGESTIF	DR BILLARD RIPH1
Traitement par mésothérapie du Syndrome de l'Intestin Irritable (MESOCOLO) Etude interventionnelle monocentrique prospective ouverte		
MIMS	HÔPITAL PRIVÉ DE LA BAIE - AVRANCHES MULTICENTRIQUE HORS-ONCO OPHTHALMO	DR MIGUEL RIPH2
Efficacité et sécurité de la Micro-sclérostomie mini-invasive (MIMS) dans la chirurgie du glaucome		
MONITOAVANTPIED	CLINIQUE DE L'EUROPE - AMIENS MONOCENTRIQUE HORS-ONCO ORTHOPEDIQUE	DR BELDAME RIPH2
Suivi précoce post-opératoire par capteur des patients opérés de l'avant-pied		
NEUROSUDOSCAN	LES HÔPITAUX PRIVÉS RENNAIS - SAINT-GRÉGOIRE MONOCENTRIQUE ONCOLOGIE NEURO	DR PIHAN RIPH2
Prévention des douleurs neuropathiques de l'oxaliplatine par la photobiomodulation - Etude prospective, monocentrique, en simple aveugle.		
OEDEME PIEDS	CLINIQUE MEGIVAL MULTICENTRIQUE HORS-ONCO ORTHOPEDIQUE	DR BELDAME RIPH2
Quantification et caractérisation d'un oedeme post-opératoire du pied		
PAKO HDJ	CHP BREST PASTEUR - BREST MONOCENTRIQUE ONCOLOGIE PARAMEDICAL	DR VUARIN RIPH2
Parcours d'accompagnement des patients opérés d'un cancer ORL en HdJ soins de support		
PHARMAIMPACT 2	POLYCLINIQUE LYON NORD MULTICENTRIQUE ONCOLOGIE PHARMACIE	DR LECOINTRE RIPH2
Évaluation de l'impact du pharmacien clinicien en établissement de Santé dans l'initiation et le suivi des thérapies orales en oncologie.		

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

associées aux études cliniques

**Partager notre
expertise avec
la communauté
scientifique**

Source : Liste des publications 2023 associées aux études cliniques (Classement par catégorie)

A Am J Obstet GYNéCOL (IF : 8.7) **Cardailiac C , Levesque A , Riant T , Mortier A , Neunlist M , Perrouin-Verbe MA & al** - Evaluation of a scoring system for the detection of central sensitization among women with chronic pelvic pain. NCT03541954

A Clin Gastroenterol Hepatol (IF : 11.6) **Bouhnik, Y ; Pineton de Chambrun, G ; Lambert, J ; Nachury, M ; Seksik, P ; Altwegg, R & al** - Adalimumab in Biologic-naïve Patients With Crohn's Disease After Resolution of an Intra-abdominal Abscess: A Prospective Study From the GETAID. NCT02856763

A Endoscopy (IF : 11.5) **Karsenti D , Privat J , Charissoux A , Perrot B , Leblanc S , Chaput U & al** - Multicenter randomized trial comparing diagnostic sensitivity and cellular abundance with aggressive versus standard biliary brushing for bile duct stenosis without mass syndrome. NCT04251013

A Endoscopy (IF : 11.5) **Patenotte A , Yzet C , Wallenhorst T , Subtil F , Leblanc S , Schaefer M & al** - Diagnostic endoscopic submucosal dissection for colorectal lesions with suspected deep invasion. NCT04592003

A Endoscopy (IF : 11.5) **Yzet C , Le Baleur Y , Albouys J , Jacques J , Doumbe-Mandengue P , Barret M & al** - Use of endoscopic submucosal dissection or full-thickness resection device to treat residual colorectal neoplasia after endoscopic resection: a multicenter historical cohort study. NCT04592003

A Gastroenterology (IF : 25.7) **Teoh AYW , Napoleon B , Kunda R , Arcidiacono PG , Kongkam P , Larghi A & al** - EUS-Guided Choledochoduodenostomy Using Lumen Apposing Stent Versus ERCP With Covered Metallic Stents in Patients With Unresectable Malignant Distal Biliary Obstruction: A Multicenter Randomized Controlled Trial (DRA-MBO Trial). NCT03000855

A GYNéCOL Oncol (IF : 4.5) **Ferron G , De Rauglaudre G , Becourt S , Delanoy N , Joly F , Lortholary A & al** - Neoadjuvant chemotherapy with or without nintedanib for advanced epithelial ovarian cancer: Lessons from the GINECO double-blind randomized phase II CHIVA trial. NCT01583322

A GYNéCOL Oncol (IF : 4.5) **Pignata S , Bookman M , Sehouli J , Miller A , Penson RT , Taskiran C & al** - Overall survival and patient-reported outcome results from the placebo-controlled randomized phase III IMagyn050/GOG 3015/ENGOT-OV39 trial of atezolizumab for newly diagnosed stage III/IV ovarian cancer. NCT03038100

A J Med Internet Res (IF : 5.8) **Le Du K , Septans AL , Maloisel F , Vanquaethem H , Schmitt A , Le Goff M & al** - A New Option for Pain Prevention Using a Therapeutic Virtual Reality Solution for Bone Marrow Biopsy (REVEH Trial): Open-Label, Randomized, Multicenter, Phase 3 Study. NCT03483194

A JACC Cardiovasc Imaging (IF : 12.8) **Huttin O , Girerd N , Jobbe-Duval A , Constant Dît Beauvils AL , Senage T , Filippetti L & al** - Machine Learning-Based Phenotyping in MVP Identifies Profiles Associated With Myocardial Fibrosis and Cardiovascular Events. NCT02879825, NCT03884426

A JAMA Netw Open (IF : 10.5) **Boige V , Blons H , François E , Ben Abdelghani M , Phelip JM , Le Brun-Ly V & al** - Maintenance Therapy With Cetuximab After FOLFIRI Plus Cetuximab for RAS Wild-Type Metastatic Colorectal Cancer: A Phase 2 Randomized Clinical Trial. NCT02404935

A JAMA Oncol (IF : 22.5) **Castelli J , Thariat J , Benezery K , Hasbini A , Gery B , Berger A & al** - Weekly Adaptive Radiotherapy vs Standard Intensity-Modulated Radiotherapy for Improving Salivary Function in Patients With Head and Neck Cancer: A Phase 3 Randomized Clinical Trial. NCT01874587

A Ophthalmology (IF : 13.1) **Gabrielle PH , Delyfer MN , Glacet-Bernard A , Conart JB , Uzzan J , Kodjikian L & al** - Surgery, Tissue Plasminogen Activator, Antiangiogenic Agents, and Age-Related Macular Degeneration Study: A Randomized Controlled Trial for Submacular Hemorrhage Secondary to Age-Related Macular Degeneration. NCT02557451

B BMC Complement Med Ther (IF : 3.3) **Le Rhun A , Caillet P , Lebeaupin M , Duval M , Guilmault L , Anthoine E & al** - Mind-body and art therapies impact on emotional regulation in patients with chronic diseases: a pragmatic mixed-methods randomized controlled trial. NCT02911207

B BMJ Open (IF : 2.4) **Allaart LJH , Lech J , Macken AA , Kling A , Lafosse L , Lafosse T & al** - Biomodulating healing after arthroscopic rotator cuff repair: the protocol of a randomised proof of concept trial (BIOHACK). NCT04618484

B Heart Rhythm (IF : 5.6) **Laredo M , Duthoit G , Sacher F , Anselme F , Audinet C , Bessière F & al** - Rapid ventricular tachycardia in patients with tetralogy of Fallot and implantable cardioverter-defibrillator: Insights from the DAI-T4F nationwide registry. NCT03837574

B Tech Coloproctol (IF : 2.7) **Laurain A , Bouchard D , Rouillon JM , Petit P , Liddo A , Vinson Bonnet B & al** - French multicentre prospective evaluation of radiofrequency ablation in the management of haemorrhoidal disease. NCT04229784

D Curr Eye Res (IF : 1.7) **Sukkarieh G , Bonnin S , Azar G , Lafolie J , Alonso AS , Erol O & al** - Outcome of Patients Treated by Intravitreal Injections During the COVID-19 Lockdown: An Institutional Experience. NCT04395859

D J Interv Card Electrophysiol (IF : 2.1) **Gras D , Clémenty N , Ploux S , Guyomar Y , Legallois D , Segreti L & al** - CRT-D replacement strategy: results of the BioCONTINUE study. NCT02323503

D Trials (IF : 2) **Le Guill-Jaijarat C , Péréon Y , Leroy M , Lépine O , Loloum A , Peluchon C & al** - PROPERTY: study protocol for a randomized, double-blind, multicenter placebo-controlled trial assessing neurotoxicity in patients with metastatic gastrointestinal cancer taking PHYCOCARE® during oxaliplatin-based chemotherapy. NCT05025826

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

A photograph of a man and a woman in a laboratory or clinical setting. The man, on the right, has curly brown hair, a beard, and wears glasses and blue scrubs. He is looking down at a piece of paper he is holding. The woman, on the left, has short grey hair and wears glasses and a dark top. She is also looking at the paper. The background is blurred, showing laboratory equipment and a warm light source.

**Une recherche
avant tout
collaborative**

Source : Liste des publications scientifiques 2023 (Classement par catégorie)

A Ablikim M, Achasov MN, Adlarson P, Albrecht M, Aliberti R, Amoroso A & al. Evidence for the Cusp Effect in $\eta^{\prime}$ Decays into $\eta\pi^0$. *Phys Rev Lett*; 130 : 081901 PMID 36898113

A Bailleux C, Arnaud A, Frenel JS, Chabaud S, Bachelot T, You B & al. CHEOPS trial: a GINECO group randomized phase II assessing addition of a non-steroidal aromatase inhibitor to oral vinorelbine in pre-treated metastatic breast cancer patients. *Breast Cancer*; 30 : 315-328 PMID 36602669

A Balas M, Kwok JM, Miguel A, Rai A, Rai A, Ahmed IIK & al. The Cataract Surgery Learning Curve: Quantitatively Tracking a Single Resident's Operative Actions Throughout Their Training. *Am J Ophthalmol* ; 249 : 82-89 PMID 36581189

A Bauer S, Collin P, Zumstein MA, Neyton L, Blakeney WG. Current concepts in chronic traumatic anterior shoulder instability. *EFORT Open Rev*; 8 : 468-481 PMID 37289134

A Bello Roufai D, Gonçalves A, De La Motte Rouge T, Akla S, Blonz C, Grenier J & al. Alpelisib and fulvestrant in PIK3CA-mutated hormone receptor-positive HER2-negative advanced breast cancer included in the French early access program. *Oncogene*; 42 : 1951-1956 PMID 36611120

A Benali K, Barré V, Hermida A, Galand V, Milhem A, Philibert S & al. Recurrences of Atrial Fibrillation Despite Durable Pulmonary Vein Isolation: The PARTY-PVI Study. *Circ Arrhythm Electrophysiol* ; 16 : e011354 PMID 36802906

A Billa O, Bonnetain F, Chamois J, Ligey A, Ganansia V, Renard S & al. Predictive value of health-related quality of life on radiotherapy-related toxicities in patients with head and neck cancer. *Support Care Cancer*; 31 : 268 PMID 37058164

A Blanc-Durand F, Yaniz-Galende E, Llop-Guevara A, Genestie C, Serra V, Herencia-Ropero A & al. A RAD51 functional assay as a candidate test for homologous recombination deficiency in ovarian cancer. *GYNECOL Oncol*; 171 : 106-113 PMID 36868112

A Caiazzo R, Bauvin P, Marciniak C, Saux P, Jacqmin G, Arnoux R & al. Impact of Robotic Assistance on Complications in Bariatric Surgery at Expert Laparoscopic Surgery Centers: A Retrospective Comparative Study With Propensity Score. *Ann Surg*; 278 : 489-496 PMID 37389476

A Chalin A, Turlin B, Ousmen A, Michalak S, Mueller J, Mueller S & al. Non-invasive diagnosis of alcohol-related steatohepatitis in patients ongoing alcohol withdrawal based on cytokeratin 18 and transient elastography. *Aliment Pharmacol Ther*; 58 : 80-88 PMID 37078366

A Charbit-Henrion, F ; Haas, M ; Chaussade, S ; Cellier, C ; Cerf-Bensussan, N ; Malamut, G & al. Genetic Diagnosis Guides Treatment of Autoimmune Enteropathy. *Clin Gastroenterol Hepatol* ; 21 : 1368-1371.e2 PMID 35944833

A Chour A, Denis J, Mascaux C, Zysman M, Bigay-Game L, Swalduz A & al. Brief Report: Severe Sotorasib-Related Hepatotoxicity and Non-Liver Adverse Events Associated With Sequential Anti-Programmed Cell Death (Ligand)1 and Sotorasib Therapy in KRAS ^{G12C}-Mutant Lung Cancer. *J Thorac Oncol*; 18 : 1408-1415 PMID 37217096

A Colomba E, Alexandre J, Le Teuff G, Genestie C, Coupeux D, Coquard IR & al. Response to first line platinum-based chemotherapy in mismatch repair deficient (MMRd)/ microsatellite instability high (MSI-high) endometrial carcinoma. *GYNECOL Oncol*; 169 : 78-84 PMID 36521352

A Costedoat I, Wallaert M, Gaultier A, Vasseur R, Vanhaecke C, Viguier M & al. Multicenter prospective observational study of dupilumab-induced ocular events in atopic dermatitis patients. *J Eur Acad Dermatol Venereol*; 37 : 1056-1063 PMID 36732052

A Coupier A, Khoury T, Gincul R, Fumex F, Lisotti A, Leblanc S & al. Endoscopic ultrasound-guided radiofrequency ablation for solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas. *Endoscopy*; 55 : E951-E952 PMID 37604456

A Courtine M, Bourredjem A, Gouteron A, Fournel I, Bartolone P, Baulot E & al. Functional recovery after total hip/knee replacement in obese people: A systematic review. *Ann Phys Rehabil Med*; 66 : 101710 PMID 36459889

A Crinò SF, Napoleon B, Facciorusso A, Lakhtakia S, Borbath I, Caillol F & al. Endoscopic Ultrasound-guided Radiofrequency Ablation Versus Surgical Resection for Treatment of Pancreatic Insulinoma. *Clin Gastroenterol Hepatol*; 21 : 2834-2843.e2 PMID 36871765

A De Cristofaro E, Masgnaux LJ, Saurin JC, Jacques J, Napoléon B, Rivory J & al. Multipolar adaptive traction makes endoscopic submucosal dissection feasible for large neoplastic area of the fundus in patient with familial adenomatous polyposis. *Endoscopy*; 55 : E963-E964 PMID 37604442

A De Cristofaro E, Rivory J, Masgnaux LJ, Grimaldi J, Yzet C, Leblanc S & al. Multipolar traction with an eight-point adaptive traction device allowed comfortable resection of a challenging giant rectal lesion in ulcerative colitis. *Endoscopy*; 55 : E1029-E1030 PMID 37714206

A Dumontet C, Demangel D, Galia P, Karlin L, Roche L, Fauvernier M & al. Clinical characteristics and outcome of 318 families with familial monoclonal gammopathy: A multicenter Intergrroupe Francophone du Myélome study. *Am J Hematol*; 98 : 264-271 PMID 36588407

- A** Friedman RJ, Boettcher ML, Grey S, Flurin PH, Wright TW, Zuckerman JD & al. Comparison of long-term clinical and radiological outcomes for cemented keel, cemented peg, and hybrid cage glenoids with anatomical total shoulder arthroplasty using the same humeral component. *Bone Joint J*; 105-B : 668-678 PMID 37259565
- A** Garnier M, Constantin JM, Cinotti R, Daoui C, Margetis D, Destruhaut G & al. Association of preoperative COVID-19 and postoperative respiratory morbidity during the Omicron epidemic wave: the DROMIS-22 multicentre prospective observational cohort study. *EClinicalMedicine*; 58 : 101881 PMID 36873425
- A** Grimaldi J, Napoléon B, Masgnaux LJ, Leblanc S, Rivory J, Lépilliez V & al. Endoscopic submucosal dissection of a laterally spreading tumor totally invading a deep sigmoidal diverticulum using an adaptive traction strategy. *Endoscopy*; 55 : E898-E899 PMID 37442163
- A** Guindolet D, Gemahling A, Azar G, Disegni H, Samie M, Cochereau I & al. Detecting Subclinical Corneal Edema Using Corneal Thickness Mapping in Patients Presenting Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy. *Am J Ophthalmol*; 246 : 58-65 PMID 36228778
- A** Humbert M, Lequesne J, Licaj I, Bon-Mardion N, Bouhnik AD, Huyghe E & al. Sexual health at 5 years after diagnosis of head and neck cancer. *Support Care Cancer*; 31 : 535 PMID 37615815
- A** Leboulleux S, Do Cao C, Zerdoud S, Attard M, Bournaud C, Lacroix L & al. A Phase II Redifferentiation Trial with Dabrafenib-Trametinib and 131I in Metastatic Radioactive Iodine Refractory BRAF p.V600E-Mutated Differentiated Thyroid Cancer. *Clin Cancer Res*; 29 : 2401-2409 PMID 37074727
- A** Lequesne J, Joly F, Peron J, Ray-Coquard I, Hardy-Bessard AC, Selle F & al. Evaluation of Scores to Reflect Toxicity Impact on Quality of Life of Patients With Platinum-Resistant Ovarian Cancer: AURELIA Substudy. *J Natl Compr Canc Netw*; 21 : 473-479.e4 PMID 37156482
- A** Macken AA, Haagmans-Suman A, van Spekenbrink-Spooren A, van Noort A, van den Bekerom MPJ, Eygendaal D & al. Anterosuperior versus deltopectoral approach for primary reverse total shoulder arthroplasty. *Bone Joint J*; 105-B : 1000-1006 PMID 37652454
- A** Martin AC, Weizman O, Sellal JM, Algallarrondo V, Amara W, Bouzeman A & al. Impact of peri-procedural management of direct oral anticoagulants on pocket haematoma after cardiac electronic device implantation: the StimAOD multicentre prospective study. *Europace*; 25 PMID 36932714
- A** Menendez ME, Collin P, Denard PJ. Clinical Faceoff: Tenotomy Versus Tenodesis for the Treatment of Proximal Biceps Pathology. *Clin Orthop Relat Res*; 481 : 455-457 PMID 36198115
- A** Michoud C, Khoury T, Lisotti A, Gincul R, Leblanc S, Lemaistre AI & al. Needle-based confocal laser endomicroscopy for cystic lymphangiomas of the pancreas: the first case series. *Endoscopy*; 55 : E594-E595 PMID 36996892
- A** Milhem A, Anselme F, Da Costa A, Abbey S, Mansourati J, Bader H & al. ATE Score Diagnostic Accuracy for Predicting the Absence of Intra-Atrial Thrombi Before AF Ablation. *JACC Clin Electrophysiol*; 9 : 2550-2557 PMID 37804261
- A** Mouheb M, Pierre-Jean M, Fermé C, Devillers A, Lamy T, Le Jeune F & al. Dissemination patterns of Hodgkin lymphoma using a probability network model based on [¹⁸F]-FDG PET/CT. *Eur J Nucl Med Mol Imaging*; 50 : 1414-1422 PMID 36522437
- A** Palmier M, Pochulu B. Malposition of Distal Sealing Ring: Just Grasp It? *Eur J Vasc Endovasc Surg*; 65 : 869 PMID 36933649
- A** Peigné M, de Mouzon J, Khiel A, Fraissinet A, Maget V, Saïas-Magnan J & al. Donated-embryo pregnancies are associated with increased risk of hypertensive disorders even for young recipients: a retrospective matched-cohort study. *Fertil Steril*; 119 : 69-77 PMID 36283865
- A** Perréard, M ; Heutte, N ; Clarisse, B ; Humbert, M ; Leconte, A ; Géry, B & al. Head and neck cancer patients under radiotherapy undergoing skin application of hydrogel dressing or hyaluronic acid: results from a prospective, randomized study. *Support Care Cancer*; 32 : 7 PMID 38055076
- A** Ponderand L, Guimard T, Lazaro E, Dupuy H, Peuchant O, Roch N & al. Case Studies and Literature Review of Francisella tularensis-Related Prosthetic Joint Infection. *Emerg Infect Dis*; 29 : 1118-1126 PMID 37209668
- A** Pradere B, Mallet R, de La Taille A, Bladou F, Prunet D, Beurrier S & al. Climate-smart Actions in the Operating Theatre for Improving Sustainability Practices: A Systematic Review. *Eur Urol*; 83 : 331-342 PMID 35151515
- A** Ray-Coquard I, Leary A, Pignata S, Cropet C, González-Martín A, Marth C & al. Olaparib plus bevacizumab first-line maintenance in ovarian cancer: final overall survival results from the PAOLA-1/ENGOT-ov25 trial. *Ann Oncol*; 34 : 681-692 PMID 37211045
- A** Remy-Jardin M, Hutt A, Flohr T, Faivre JB, Felloni P, Khung S & al. Ultra-High-Resolution Photon-Counting CT Imaging of the Chest: A New Era for Morphology and Function. *Invest Radiol*; 58 : 482-487 PMID 36897831
- A** Risser G, Mechleb N, Muselier A, Gatinel D, Zéboulon P. Novel deep learning approach to estimate rigid gas permeable contact lens base curve for keratoconus fitting. *Cont Lens Anterior Eye*; 46 : 102063 PMID 37777429

A Rousset P, Florin M, Bharwani N, Touboul C, Monroc M, Golfier F & al. Deep pelvic infiltrating endometriosis: MRI consensus lexicon and compartment-based approach from the ENDOVALIRM group. *Diagn Interv Imaging*; 104 : 95-112 PMID 36404224

A Simonnot M, Deprez PH, Pioche M, Albuissou E, Wallenhorst T, Caillol F & al. Endoscopic resection of early esophageal tumors in patients with cirrhosis or portal hypertension: a multicenter observational study. *Endoscopy*; 55 : 785-795 PMID 37137331

A Starek Z, Di Cori A, Betts TR, Clerici G, Gras D, Lyan E & al. Baseline left atrial low-voltage area predicts recurrence after pulmonary vein isolation: WAVE-MAP AF results. *Europace*; 25 PMID 37470443

A Sukkarieh G, Lejoyeux R, LeMer Y, Bonnin S, Tadayoni R. The role of near-infrared reflectance imaging in retinal disease: A systematic review. *Surv Ophthalmol*; 68 : 313-331 PMID 36535488

A Tao Y, Biau J, Sun XS, Sire C, Martin L, Alfonsi M & al. Pembrolizumab versus cetuximab concurrent with radiotherapy in patients with locally advanced squamous cell carcinoma of head and neck unfit for cisplatin (GORTEC 2015-01 PembroRad): a multicenter, randomized, phase II trial. *Ann Oncol*; 34 : 101-110 PMID 36522816

A Thariat J, Mathis T, Pace-Loscos T, Peyrichon ML, Maschi C, Rosier L & al. Single-Masked Randomized Phase 2 Study Assessing 2 Forms of Hypofractionated Proton Therapy in Patients With Large Choroidal Melanomas. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*; 117 : 357-369 PMID 37257661

A Thomassin-Naggara I, Monroc M, Chauveau B, Fauconnier A, Verpillat P, Dabi Y & al. Multicenter External Validation of the Deep Pelvic Endometriosis Index Magnetic Resonance Imaging Score. *JAMA Netw Open*; 6 : e2311686 PMID 37140921

A Vendittoli PA, Riviere C, Hirschmann MT, Bini S. Why personalized surgery is the future of hip and knee arthroplasty: a statement from the Personalized Arthroplasty Society. *EFORT Open Rev*; 8 : 874-882 PMID 38038379

A Vu Trung K, Abou-Ali E, Caillol F, Paik WH, Napoleon B, Masaryk V & al. Endoscopic papillectomy for ampullary lesions in patients with familial adenomatous polyposis compared with sporadic lesions: a propensity score-matched cohort. *Endoscopy*; 55 : 709-718 PMID 36746390

B Adam T, Boucenna W, Lussato M, Hagege A, Berguiga M, Marechal M & al. Presbyopic LASIK using the Supracor algorithm and micromonovision in presbyopic myopic patients: 12-month visual and refractive outcomes. *J Cataract Refract Surg*; 49 : 195-200 PMID 36325836

B Ah-Thiane L, Rousseau C, Aumont M, Cailleteau A, Doré M, Mervoyer A & al. The Sentinel Lymph Node in Treatment Planning: A Narrative Review of Lymph-Flow-Guided Radiotherapy. *Cancers (Basel)*; 15 PMID 37345071

B Albouys J, Janet J, Gaujoux S, Napoleon B, Durand Fontanier S, Jacques J & al. ASO Author Reflections: Preoperative Biliary Drainage Before Pancreatic Surgery. *Ann Surg Oncol*; 30 : 5047-5048 PMID 37103722

B Allaart L J H, Spanning S V, Lafosse L, Lafosse T, Ladermann A, Athwal G S & al. Developing a machine learning algorithm to predict probability of retear and functional outcomes in patients undergoing rotator cuff repair surgery: protocol for a retrospective, multicentre study. *BMJ Open*; 13 : e063673 PMID 36764713

B Amouyel T, Barbier O, De L'Escalopier N, Cordier G, Baudrier N, Benoist J & al. Higher preoperative range of motion is predictive of good mid-term results in the surgical management of osteochondral lesions of the talus: a prospective multicentric study. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*; 31 : 3044-3050 PMID 35094097

B Amrane K, Thuillier P, Bourhis D, Le Meur C, Quere C, Leclerc JC & al. Prognostic value of pre-therapeutic FDG-PET radiomic analysis in gastro-esophageal junction cancer. *Sci Rep*; 13 : 5789 PMID 37031233

B Beirnaert J, Pinar U, Benarroche D, Akakpo W, Rouprêt M. Evaluation of patient satisfaction using the validated French version of the SSIPI questionnaire after inflatable penile implantation. *J Sex Med*; 21 : 67-71 PMID 38014798

B Berger A, Perrod G, Pioche M, Barret M, Cesbron-Métivier E, Lépilliez V & al. Efficacy of Organ Preservation Strategy by Adjuvant Chemoradiotherapy after Non-Curative Endoscopic Resection for Superficial SCC: A Multicenter Western Study. *Cancers (Basel)*; 15 PMID 36765546

B Bijok B, Jaulin F, Picard J, Michelet D, Fuzier R, Arzalier-Daret S & al. Guidelines on human factors in critical situations 2023. *Anaesth Crit Care Pain Med*; 42 : 101262 PMID 37290697

B Billaud A, Baverel L, Metais P. Arthroscopic Latarjet yields better union and prevention of instability compared to arthroscopic bony Bankart repair in shoulders with recurrent anterior instability: a systematic review. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*; 31 : 5994-6005 PMID 37980282

B Biset A, Douiri A, Robinson JR, Laboudie P, Colombet P, Graveleau N & al. Tibial tunnel expansion does not correlate with four-strand graft maturation after ACL reconstruction using adjustable cortical suspensory fixation. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*; 31 : 1761-1770 PMID 35876906

B Braden B, Hocke M, Selvaraj E, Kaushal K, Möller K, Ignee A & al. Mishaps with EUS-guided lumen-apposing metal stents in therapeutic pancreatic EUS: Management and prevention. *Endosc Ultrasound*; 12 : 393-401 PMID 37969170

- B** Campedel L, Compérat E, Cancel-Tassin G, Varinot J, Pfister C, Delcourt C & al. Prognostic value of programmed death ligand-1 and programmed death-1 expression in patients with upper tract urothelial carcinoma. *BJU Int*; 132 : 581-590 PMID 37488983
- B** Carey W, Trévidic P, Benedetto AV, Maffert P, Antunes S. Creation and Validation of a Photonumeric Scale for Assessment of Infraorbital Hollows. *Dermatol Surg*; 49 : 777-782 PMID 37523595
- B** Chaigneau T, Morello R, Vannier E, Musikas M, Piquet MA, Dupont B. Impact of sarcopenic obesity on predicting the severity of acute pancreatitis. *Dig Liver Dis*; 55 : 926-932 PMID 36849286
- B** Chammas PE, Pastor M, Chammas M, Buijze GA. Standard views do not suffice in assessing distal scaphoid articular cannulated screw penetration. *J Orthop Traumatol*; 24 : 57 PMID 37946093
- B** Chartier-Kastler E, Le Normand L, Ruffion A, Saussine C, Braguet R, Rabut B & al. Five-year Results from the Prospective, Multicenter, Observational SOUNDS Study of Patients with Overactive Bladder Treated with the InterStim System for Sacral Neuromodulation. *Eur Urol Focus*; 9 : 765-772 PMID 37019729
- B** Cohen M, Puntonet J, Sanchez J, Kierszbaum E, Crema M, Soyer P & al. Artificial intelligence vs. radiologist: accuracy of wrist fracture detection on radiographs. *Eur Radiol*; 33 : 3974-3983 PMID 36515712
- B** Crinò SF, Partelli S, Napoleon B, Conti Bellocchi MC, Facciorusso A, Salvia R & al. Study protocol for a multicenter randomized controlled trial to compare radiofrequency ablation with surgical resection for treatment of pancreatic insulinoma. *Dig Liver Dis*; 55 : 1187-1193 PMID 37407318
- B** Dandache C, Confavreux CB, Gavaille A, Massy E, Chambard L, Rambaud J & al. Peripheral but not axial muscle mass is associated with early mortality in bone metastatic lung cancer patients at diagnosis. *Joint Bone Spine*; 90 : 105613 PMID 37442335
- B** Dervaux M, Thumerelle C, Fabre C, Abou-Taam R, Bihouee T, Brouard J & al. Long-term evolution of neuroendocrine cell hyperplasia of infancy: the FRENCHI findings. *Eur J Pediatr*; 182 : 949-956 PMID 36449078
- B** Doucet L, Cailleteau A, Vaugier L, Gourmelon C, Bureau M, Salaud C & al. Association between post-operative hPG ₈₀ (circulating progastrin) detectable level and worse prognosis in glioblastoma. *ESMO Open*; 8 : 101626 PMID 37713930
- B** Douiri A, Bouguennec N, Biset A, Colombet P, Laboudie P, Graveleau N. Functional scores and prosthetic implant placement are different for navigated medial UKA left in varus alignment. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*; 31 : 3919-3926 PMID 37004530
- B** El Hussein K, Baste JM, Bouyeure-Petit AC, Lhuillier E, Cuvelier A, Decazes P & al. Respiratory muscle metabolic activity on PET/CT correlates with obstructive ventilatory defect severity and prognosis in patients undergoing lung cancer surgery. *Respirology*; 28 : 551-560 PMID 36855939
- B** Falchero L, Guisier F, Darrason M, Boyer A, Dayen C, Cousin S & al. Long-term effectiveness and treatment sequences in patients with extensive stage small cell lung cancer receiving atezolizumab plus chemotherapy: Results of the IFCT-1905 CLINATEZO real-world study. *Lung Cancer*; 185 : 107379 PMID 37757576
- B** Feray S, Lemoine A, Aveline C, Quesnel C. Pain management after thoracic surgery or chest trauma. *Minerva Anesthesiol*; 89 : 1022-1033 PMID 37671536
- B** Fernoux P, Delorme E, Foote A, Faucheron JL. The suspended ileal loop for difficult Hartmann's reversal. *Tech Coloproctol*; 27 : 243-246 PMID 36316535
- B** Figueiredo M, Yzet C, Wallenhorst T, Rivory J, Rostain F, Schaefer M & al. Endoscopic submucosal dissection of appendicular lesions is feasible and safe: a retrospective multicenter study (with video). *Gastrointest Endosc*; 98 : 634-638 PMID 37380005
- B** Fournier E, Selegny M, Amsallem M, Haddad F, Cohen S, Valdeolillos E & al. Multiparametric evaluation of right ventricular function in pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart disease. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)*; 76 : 333-343 PMID 35940550
- B** Gaillandre Y, Duhamel A, Flohr T, Faivre JB, Khung S, Hutt A & al. Ultra-high resolution CT imaging of interstitial lung disease: impact of photon-counting CT in 112 patients. *Eur Radiol*; 33 : 5528-5539 PMID 37071165
- B** Geyl S, Redelsperger B, Yzet C, Napoleon B, Legros R, Dahan M & al. Risk factors for stent dysfunction during long-term follow-up after EUS-guided biliary drainage using lumen-apposing metal stents: A prospective study. *Endosc Ultrasound*; 12 : 237-244 PMID 36891940
- B** Girard C, El-Akri M, Durand M, Guérin O, Cornu JN, Brierre T & al. Efficacy, Safety, and Reoperation-free Survival of Artificial Urinary Sphincter in Non-neurological Male Patients over 75 Years of Age. *Eur Urol Open Sci*; 53 : 23-30 PMID 37441348
- B** Guindolet D, Huynh O, Martin GC, Disegni H, Azar G, Cochereau I & al. Cystoid macular oedema after descemet membrane endothelial keratoplasty. *Br J Ophthalmol*; 107 : 470-475 PMID 34750101
- B** Guiraud K, Nunes GA, Vega J, Cordier G. High body mass index is not a contraindication for an arthroscopic ligament repair with biological augmentation in case of chronic ankle instability. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*; 31 : 5222-5227 PMID 37713126

B Halimi F, Sabouret P, Huberman JP, Ouazana L, Guedj D, Djouadi K & al. Atrial fibrillation detection with long-term continuous Holter ECG recording in patients with high cardiovascular risk and clinical palpitations: the prospective after study. *Clin Res Cardiol*; 112 : 807-814 PMID 36169720

B Harvey N, Garmestani A, Allen CR, Buijze A, van Rijswijk M. Identifying untapped legal capacity to promote multi-level and cross-sectoral coordination of natural resource governance. *Sustain Sci*; 19 : 325-346 PMID 38362047

B Janet J, Albouys J, Napoleon B, Jacques J, Mathonnet M, Magne J & al. Pancreatoduodenectomy Following Preoperative Biliary Drainage Using Endoscopic Ultrasound-Guided Choledochoduodenostomy Versus a Transpapillary Stent: A Multicenter Comparative Cohort Study of the ACHBT-FRENCH-SFED Intergroup. *Ann Surg Oncol*; 30 : 5036-5046 PMID 37069476

B Jiang J, Chao WL, Cao T, Culp S, Napoléon B, El-Dika S & al. Improving Pancreatic Cyst Management: Artificial Intelligence-Powered Prediction of Advanced Neoplasms through Endoscopic Ultrasound-Guided Confocal Endomicroscopy. *Biomimetics (Basel)*; 8 PMID 37887627

B Jiao Y, Truong T, Eon-Marchais S, Mebirouk N, Caputo SM, Dondon MG & al. Association and performance of polygenic risk scores for breast cancer among French women presenting or not a familial predisposition to the disease. *Eur J Cancer*; 179 : 76-86 PMID 36509001

B Kermansaravi M, Parmar C, Chiappetta S, Shikora S, Aminian A, Abbas SI & al. Best practice approach for redo-surgeries after sleeve gastrectomy, an expert's modified Delphi consensus. *Surg Endosc*; 37 : 1617-1628 PMID 36693918

B Khorrami Kashi A, Keilani C, Nguyen TH, Keller P, Elahi S, Piaton JM. Dacryolithiasis diagnosis and treatment: a 25-year experience using nasal endoscopy. *Br J Ophthalmol*; 107 : 289-294 PMID 34561218

B Khoury T, Sbeit W, Napoléon B. Endoscopic ultrasound guided radiofrequency ablation for pancreatic tumors: A critical review focusing on safety, efficacy and controversies. *World J Gastroenterol*; 29 : 157-170 PMID 36683710

B Kimmeyer M, Schmalzl J, Rentschler V, Schieffer C, Macken A, Gerhardt C & al. Correct positioning of the calcar screw leads to superior results in proximal humerus fractures treated with carbon-fibre-reinforced polyetheretherketone plate osteosynthesis with polyaxial locking screws. *J Orthop Traumatol*; 24 : 54 PMID 37816859

B King JJ, Wright L, Hao KA, Roche C, Wright TW, Vasilopoulos T & al. The Shoulder Arthroplasty Smart Score Correlates Well With Legacy Outcome Scores Without a Ceiling Effect. *J Am Acad Orthop Surg*; 31 : 97-105 PMID 36580051

B Laland M, François M, D'Amico F, Zallot C, Brochard C, Dewitte M & al. Identification of the optimal medical and surgical management for patients with perianal fistulising Crohn's disease. *Colorectal Dis*; 25 : 75-82 PMID 36016511

B Lavantes P, Poignard A, Delambre J, Queinnee S, Dufour T, Arvieu R & al. Influence of the preoperative L5S1 disc state on lateral L2 to L5 fusion's outcomes at an average follow-up of 3,5 years (minimum 2 years). *Eur Spine J*; 32 : 2344-2349 PMID 37209209

B Lazrek O, Karam KM, Bouché PA, Billaud A, Pourchot A, Godeneche A & al. A new self-assessment tool following shoulder stabilization surgery, the auto-Walch and auto-Rowe questionnaires. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*; 31 : 2593-2601 PMID 36586000

B Lelong M, Josien R, Coste-Burel M, Rimbart M, Bressollette-Bodin C, Nancey S & al. The risk of COVID-19 in IBD patients is increased by urban living and is not influenced by disease activity or intravenous biologics. *Front Immunol*; 14 : 1243898 PMID 37701431

B Machicado JD, Napoleon B, Akshintala V, Bazarbashi AN, Bilal M, Corral JE & al. Structured training program on confocal laser endomicroscopy for pancreatic cystic lesions: a multicenter prospective study among early-career endosonographers (with video). *Gastrointest Endosc*; 98 : 953-964 PMID 37473969

B Macken AA, Macken LC, Oosterhoff JHF, Boileau P, Athwal GS, Doornberg JN & al. Developing a machine learning algorithm to predict the probability of aseptic loosening of the glenoid component after anatomical total shoulder arthroplasty: protocol for a retrospective, multicentre study. *BMJ Open*; 13 : e074700 PMID 37852772

B Macken AA, Prkić A, van Oost I, Spekenbrink-Spooren A, The B, Eygendaal D. Implant survival of total elbow arthroplasty: analysis of 514 cases from the Dutch Arthroplasty Registry. *Bone Jt Open*; 4 : 110-119 PMID 37051858

B Maeder B, Becce F, Kehtari S, Monier A, Chaboudez E, Rothenfluh DA & al. Evolution of the Cross-Sectional Area of the Osseous Lumbar Spinal Canal across Decades: A CT Study with Reference Ranges in a Swiss Population. *Diagnostics (Basel)*; 13 PMID 36832223

B Malka D, Verret B, Faron M, Guimbaud R, Caramella C, Edeline J & al. Hepatic arterial oxaliplatin plus intravenous 5-fluorouracil and cetuximab for first-line treatment of colorectal liver metastases: A multicenter phase II trial. *Eur J Cancer*; 195 : 113400 PMID 37922632

- B** Martinez L, Lalevée M, Beldame J, L'Hermette M, Brunel H, Dujardin F & al. Reliability of a new computerized equinometer based on Silfverskiöld test to measure gastrocnemius tightness. *PLoS One*; 18 : e0284279 PMID 37043480
- B** Mignot F, Fabiano E, Xylinas E, Alati A, Méjean A, Masson-Lecomte A & al. Clinical outcomes of adapted hypofractionated radiotherapy for bladder cancer in elderly patients. *BJU Int*; 132 : 56-64 PMID 36745012
- B** Moreno-Lopez N, Mvouama S, Bourredjem A, Fournel I, Perrin T, Flaris A & al. CT scan for early diagnosis of anastomotic leak after colorectal surgery: is rectal contrast useful? *Tech Coloproctol*; 27 : 639-645 PMID 36264522
- B** Moret E, Lejoyeux R, Bonnin S, Azar G, Guillaume J, Le Cossec C & al. Atypical Foveal Hypoplasia in Best Disease. *J Pers Med*; 13 PMID 36836571
- B** Mouri O, Melenotte C, Guéry R, Cotteret C, Schweitzer-Chaput A, Perignon A & al. Self-application of aminoglycoside-based creams to treat cutaneous leishmaniasis in travelers. *PLoS Negl Trop Dis*; 17 : e0011492 PMID 37561802
- B** Nabergoj M, Läderrmann A, Authom T, Beaudouin E, Azar M, Wahab H & al. Stemless reverse shoulder arthroplasty: clinical and radiologic outcomes with minimum 2 years' follow-up. *J Shoulder Elbow Surg*; 32 : e464-e474 PMID 36905950
- B** Napoléon B, Lisotti A, Caillol F, Gasmi M, Ah-Soune P, Belle A & al. Risk factors for EUS-guided radiofrequency ablation adverse events in patients with pancreatic neoplasms: a large national French study (RAFPAN study). *Gastrointest Endosc*; 98 : 392-399.e1 PMID 37059368
- B** Neuzillet Y, Leon P, Seisen T, Allory Y, Audenet F, Lorient Y & al. A prospective descriptive 1-year study in France of all BCG therapy dispensations for non-muscle-invasive bladder cancer. *BJU Int*; 131 : 611-616 PMID 36462164
- B** Nigon E, Lefevre-Plesse C, Martinez A, Chauleur C, Lortholary A, Favier L & al. Clinical, pathological, and comprehensive molecular analysis of the uterine clear cell carcinoma: a retrospective national study from TMRG and GINECO network. *J Transl Med*; 21 : 408 PMID 37353806
- B** Nunes GA, Martinez LM, Cordier G, Michels F, Vega J, Moreno RS & al. The ATFL inferior fascicle, the CFL and the PTFL have a continuous footprint at the medial side of the fibula. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*; 31 : 5207-5213 PMID 37659012
- B** Paez-Escamilla M, Alabek ML, Beale O, Prensky CJ, Lejoyeux R, Friberg TR & al. An Optical Coherence Tomography-Based Measure as an Independent Estimate of Retinal Function in Retinitis Pigmentosa. *Diagnostics (Basel)*; 13 PMID 38066762
- B** Prost S, Blondel B, Bauduin E, Pesenti S, Ilharreborde B, Laouissat F & al. Do Age-Related Variations Of Sagittal Alignment Rely On SpinoPelvic Organization? An Observational Study Of 1540 Subjects. *Global Spine J*; 13 : 2144-2154 PMID 35191731
- B** Rivière C, Villet L, Roby GB. Anatomical restoration of the anterior femoral compartment when performing KATKA: the end of the flush anterior femoral cut dogma! *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*; 31 : 3037-3040 PMID 37004532
- B** Roche CP, Fan W, Simovitch R, Wright T, Flurin PH, Zuckerman JD & al. Impact of accumulating risk factors on the acromial and scapular fracture rate after reverse total shoulder arthroplasty with a medialized glenoid-lateralized humerus onlay prosthesis. *J Shoulder Elbow Surg*; 32 : 1465-1475 PMID 36731625
- B** Roche CP, Jones R, Routman H, Marczuk Y, Flurin PH, Wright TW & al. Longitudinal analysis of shoulder arthroplasty utilization, clinical outcomes, and value: a comparative assessment of changes in improvement over 15 years with a single platform shoulder prosthesis. *J Shoulder Elbow Surg*; 32 : 1562-1573 PMID 36681103
- B** Roth GS, Neuzillet C, Sarabi M, Edeline J, Malka D, Lièvre A. Cholangiocarcinoma: what are the options in all comers and how has the advent of molecular profiling opened the way to personalised medicine ? *Eur J Cancer*; 179 : 1-14 PMID 36463640
- B** Saad A, Debellemannièr G, Zeboulon P, Rizk M, Rouger H, Mazharian A & al. Discrimination between keratoconus, forme fruste keratoconus, and normal eyes using a novel OCT-based tomographer. *J Cataract Refract Surg*; 49 : 1092-1097 PMID 37532249
- B** Schell LE, Roche CP, Eichinger JK, Flurin PH, Wright TW, Zuckerman JD & al. Aseptic glenoid baseplate loosening after reverse total shoulder arthroplasty with a single prosthesis. *J Shoulder Elbow Surg*; 32 : 1584-1593 PMID 36736657
- B** Serra R, Coscas F, Boulet JF, Cabral D, Tran THC, Solinas G & al. Predictive Factors of Visual Outcome in Treatment-Naïve Diabetic Macular Edema: Preliminary Results from the Clinical Study «FOVEA». *J Clin Med*; 12 PMID 37373565
- B** Sivaloganathan S, Blakeney WG, Rivière C, Vendittoli PA. Evolution of Concepts: Can Personalized Hip Arthroplasty Improve Joint Stability? *J Clin Med*; 12 PMID 37176765

- B** Veziant J, Bouché O, Aparicio T, Barret M, El Hajbi F, Lepilliez V & al. Esophageal cancer - French intergroup clinical practice guidelines for diagnosis, treatments and follow-up (TNCD, SNFGE, FFCD, GERCOR, UNICANCER, SFCD, SFED, SFRO, ACHBT, SFP, RENAPE, SNFCP, AFEF, SFR). *Dig Liver Dis* ; 55 : 1583-1601 PMID 37635055
- B** Youderian AR, Greene AT, Polakovic SV, Davis NZ, Parsons M, Papandrea RF & al. Two-year clinical outcomes and complication rates in anatomic and reverse shoulder arthroplasty implanted with Exactech GPS intraoperative navigation. *J Shoulder Elbow Surg* ; 32 : 2519-2532 PMID 37348780
- B** Yzet C, Riault C, Brazier F, Grados L, Nguyen-Khac E, Chatelain D & al. Positive margins and plexitis increase the risk of recurrence after ileocecal resection: A systematic review and meta-analysis. *Dig Liver Dis* ; 55 : 1611-1620 PMID 36658042
- C** An JS, Bouguennec N, Batailler C, Tardy N, Rochcongar G, Frayard JM & al. Better clinical outcomes and faster weight bearing after medial opening-wedge high tibial osteotomy using allogeneic than synthetic graft: A secondary analysis of a Francophone Arthroscopy Society Symposium. *Orthop Traumatol Surg Res* ; 109 : 103700 PMID 37813331
- C** Barret M, Doridot L, Le Gall M, Beuvon F, Jacques S, Pellat A & al. Mechanisms of esophageal stricture after extensive endoscopic resection: a transcriptomic analysis. *Endosc Int Open* ; 11 : E149-E156 PMID 36741340
- C** Batailler C, Gicquel T, Bouguennec N, Steltzlen C, Tardy N, Cartier JL & al. A predictive score of high tibial osteotomy survivorship to help in surgical decision-making: the SKOOP score. *Arch Orthop Trauma Surg* ; 143 : 4843-4851 PMID 36418609
- C** Beldame J, Sacco R, Munoz MA, Masse M, Lalevée M. Assessment of the Efficiency of Measuring Foot and Ankle Edema with a 3D Portable Scanner. *Bioengineering (Basel)* ; 10 PMID 37237619
- C** Billaud A, Garcia-Maya B, Pesquer L, Pillot S. Outcomes After Open Latarjet in Patients With or Without SLAP Lesions. *Orthop J Sports Med* ; 11 : 23259671231185200 PMID 37533499
- C** Bise S, Langlet B, Pesquer L, Poussange N, Silvestre A, Dallaudiere B. Transforaminal versus interlaminar CT-guided lumbar epidural steroid injections: prospective study of 237 patients with unilateral radicular pain and up to 5 years of follow-up. *Skeletal Radiol* ; 52 : 1959-1967 PMID 36729210
- C** Bordes M, Thauinat M, Maury É, Bonin N, May O, Tardy N & al. The influence of the sacral slope on pelvic kinematics and clinical manifestations in femoroacetabular impingement. *Orthop Traumatol Surg Res* ; 109 : 103688 PMID 37739169
- C** Bouguennec N, Orce A, Laboudie P, Pelletier S, Dexhelet J, Graveleau N. Association of COVID-19 Lockdown With Increased Rate of Cyclops Syndrome in Patients With Unexpected Home-Based Self-Guided Rehabilitation After ACL Reconstruction. *Orthop J Sports Med* ; 11 : 23259671221147900 PMID 36890983
- C** Bouisset F, Ribichini F, Bataille V, Reczuch K, Lhermusier T, Dobrzycki S & al. Clinical Outcomes of Left Main Coronary Artery PCI With Rotational Atherectomy. *Am J Cardiol* ; 186 : 36-42 PMID 36343444
- C** Boullier M, Fohlen A, Viennot S, Alves A. Gastrointestinal bleeding of undetermined origin: What diagnostic strategy to propose? *J Visc Surg* ; 160 : 277-285 PMID 37344277
- C** Braccini F, Catoni I, Belfkira F, Lagier J, Roze E, Paris J & al. SAMCEP Society consensus on the treatment of upper facial lines with botulinum neurotoxin type A: A tailored approach. *J Cosmet Dermatol* ; 22 : 2692-2704 PMID 37408173
- C** Braccini F, Fanian F, Garcia P, Delmar H, Loreto F, Benadiba L & al. Comparative clinical study for the efficacy and safety of two different hyaluronic acid-based fillers with Tri-Hyal versus Vycross technology: A long-term prospective randomized clinical trial. *J Cosmet Dermatol* ; 22 : 473-485 PMID 35770300
- C** Bronowicki JP, Mialhes P, Hanslik B, Ouzan D, Larrey D, Riachi G & al. An observational, prospective, multicenter study on the utilization and effectiveness of elbasvir-grazoprevir treatment association for chronic hepatitis C in France (ZEPHYR study). *Health Sci Rep* ; 6 : e619 PMID 36479389
- C** Carlier Y, Pierreux PA. Primary repair of acute versus chronic ruptures of the distal biceps tendon. Comparison of functional results in a case-control study. *Orthop Traumatol Surg Res* ; 109 : 103559 PMID 36690325
- C** Carlier Y, Soubeyrand M. Chronic elbow instability in adults: The why, when and how of ligament reconstruction. *Orthop Traumatol Surg Res* ; 109 : 103449 PMID 36273505
- C** Coulomb R, Michaud J, Maury E, Bonin N, Krantz N, May O & al. Radiological signs of femoroacetabular impingement are linked to pelvic version in asymptomatic subjects. *Orthop Traumatol Surg Res* ; 109 : 103719 PMID 37863187
- C** Cousin T, Peyronnet B, Bentellis I, Lasri S, Taha F, Hermieu N & al. Which revision strategy is the best for non-mechanical failure of male artificial urinary sphincter? *World J Urol* ; 41 : 3663-3669 PMID 37902863
- C** de Ponthaud C, Daire E, Pioche M, Napoléon B, Fillon M, Sauvanet A & al. Cystic dystrophy in heterotopic pancreas. *J Visc Surg* ; 160 : 108-117 PMID 36966112

- C** Debellemanière G, Ghazal W, Dubois M, Rampat R, Fabre L, Panthier C & al. Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty-Induced Refractive Shift and Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty-Induced Intraocular Lens Calculation Error. *Cornea* ; 42 : 954-961 PMID 36155366
- C** Deffieux X, Pizzoferrato AC, Gaucher L, Rousset-Jablonski C, Le Ray C, Brillac T & al. Pelvic exam in GYNéCOlogy and Obstetrics: French Guidelines for Clinical Practice. *Eur J Obstet GYNéCOL Reprod Biol* ; 291 : 131-140 PMID 37871350
- C** Ducournau F, El Amiri L, Vernet P, Sapa MC, Liverneaux P. Methods of assessment of the level of surgeons for minimally invasive fixation of distal radius fractures: «expertise» versus «performance». *Int Orthop* ; 47 : 193-199 PMID 36264303
- C** Ehlinger-David A, Gorj M, Braccini F, Loreto F, Grand-Vincent A, Garcia P & al. A prospective multicenter clinical trial evaluating the efficacy and safety of a hyaluronic acid-based filler with Tri-Hyal technology in the treatment of lips and the perioral area. *J Cosmet Dermatol* ; 22 : 464-472 PMID 35718985
- C** Favreau H, Maroteau G, Praz C, Ehlinger M, Carnesecchi O, Benad K & al. Rehabilitation protocol after suturing the medial meniscus of a stable knee, a retrospective series of the Francophone Arthroscopy Society. *Orthop Traumatol Surg Res* ; 109 : 103651 PMID 37364822
- C** Gabrion M, Rattier S, Blondin E, Michaud A, Mertl P, Gabrion A. Survival and radioclinical evaluation of the Optimys™ short stem at more than 6years" mean follow-up: A retrospective study of 108 cases. *Orthop Traumatol Surg Res* ; 109 : 103470 PMID 36336294
- C** Gargouri MA, Yousfi N, Toutain J, Farès S, Lejoyeux R, Gabison E & al. Multiple Evanescent White Dot Syndrome Following COVID-19 mRNA Vaccination. *Ocul Immunol Inflamm* ; 31 : 1240-1244 PMID 36228041
- C** Guerra Bresson H, Baumann Q, El Koussaify J, Benayoun M, Maillot C, Rousseau MA & al. Arthroscopic approach in initial training: Study of a novice cohort using inverse direct and indirect approaches and its implication in the development of training programs. *Orthop Traumatol Surg Res* ; 109 : 103552 PMID 36649789
- C** Gunepin FX, Letartre R, Mouton C, Guillemot P, Common H, Thoreux P & al. Construction and validation of a functional diagnostic score in anterior cruciate ligament ruptures of the knee in the immediate post-traumatic period. Preliminary results of a multicenter prospective study. *Orthop Traumatol Surg Res* ; 109 : 103686 PMID 37776951
- C** Janet-Vendroux A, Al Zreibi C, Reverdito G, Arame A, Badia A, Masmoudi H & al. Middle lobe suffering due to malposition and 180° tilt of the 2 remaining lobes after right upper lobectomy. *Interdiscip Cardiovasc Thorac Surg* ; 36 PMID 36810693
- C** Karam E, Hollenbach M, Abou Ali E, Auriemma F, Anderloni A, Barbier L & al. Endoscopic and Surgical Management of Non-Metastatic Ampullary Neuroendocrine Neoplasia: A Multi-Institutional Pancreas2000/EPC Study. *Neuroendocrinology* ; 113 : 1024-1034 PMID 37369186
- C** Kestemont P, Fanian F, Garcia P, Grand-Vincent A, Benadiba L, Delmar H & al. Long-term efficacy and safety of a hyaluronic acid dermal filler based on Tri-Hyal technology on restoration of midface volume. *J Cosmet Dermatol* ; 22 : 2448-2456 PMID 37128822
- C** King JJ, Hones KM, Wright TW, Roche C, Zuckerman JD, Flurin PH & al. Does isolated glenosphere lateralization affect outcomes in reverse shoulder arthroplasty? *Orthop Traumatol Surg Res* ; 109 : 103401 PMID 36108822
- C** Kün-Darbois JD, Bertin H, Mouallem G, Corre P, Delabarde T, Chappard D. Bone characteristics in condylar hyperplasia of the temporomandibular joint: a microcomputed tomography, histology, and Raman microspectrometry study. *Int J Oral Maxillofac Surg* ; 52 : 543-552 PMID 36180268
- C** Läderrmann A, AlAmer N, Denard PJ, Martinho T, Hurtado JA, Collin P. Glenoid reconstruction bone loss with a pediculated coracoid autograft during shoulder arthroplasty. A technical note. *Orthop Traumatol Surg Res* ; 109 : 103542 PMID 36608899
- C** Lalevée M, Martinez L, Rey B, Beldame J, Matsoukis J, Poirier T & al. Gait analysis after total hip arthroplasty by direct minimally invasive anterolateral approach: A controlled study. *Orthop Traumatol Surg Res* ; 109 : 103521 PMID 36539033
- C** Lambrey PJ, Bonin N, Thaumat M, Gédouin JE, Flecher X, Wettstein M & al. What happens to endoscopic/arthroscopic tenotomies with iliopsoas impingement in the medium term? Review of a prospective cohort of 64 patients with a minimum follow-up of 5 years. *Orthop Traumatol Surg Res* ; 109 : 103687 PMID 37717656
- C** Latrille A, Grellet R, Moreno-Lopez N. Ileocolic intussusception. *J Visc Surg* ; 160 : 477-478 PMID 37783614
- C** Lazarus A, Gentils M, Klaes S, Ibnouhsein I, Rosier A, Moubarak G & al. Filtering of remote monitoring alerts transmitted by cardiac implantable electronic devices and reclassification of atrial fibrillation events by a new algorithm. *Cardiovasc Digit Health J* ; 4 : 149-154 PMID 37850045
- C** Lebhar J, Bryand C, Breton Y, Bourgouin A, Chatellier P, Ropars M. Can intraoperative radiation dose in percutaneous posterior thoracolumbar internal fixation be reduced by impedancemetry-guided pedicle sighting? A prospective randomized study. *Orthop Traumatol Surg Res* ; 109 : 103250 PMID 35181515

- C** Leclerc J, Beaumont M, Vibert R, Pinson S, Vermaut C, Flament C & al. AXIN2 germline testing in a French cohort validates pathogenic variants as a rare cause of predisposition to colorectal polyposis and cancer. *Genes Chromosomes Cancer*; 62 : 210-222 PMID 36502525
- C** Lejus-Bourdeau C, Pousset F, Magne C, Bazin O, Grillot N, Pichenot V. Low-cost versus high-fidelity pediatric simulators for difficult airway management training: a randomized study in continuing medical education. *Braz J Anesthesiol*; 73 : 250-257 PMID 34089749
- C** Lloyd MS, Brisben AJ, Reddy VY, Blomström-Lundqvist C, Boersma LVA, Bongiorno MG & al. Design and rationale of the MODULAR ATP global clinical trial: A novel intercommunicative leadless pacing system and the subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator. *Heart Rhythm O2*; 4 : 448-456 PMID 37520021
- C** Lopes R, Amouyel T, Benoist J, De L'Escalopier N, Cordier G, Freychet B & al. Return to sport after surgery for osteochondral lesions of the talar dome. Results of a multicenter prospective study on 58 patients. *Orthop Traumatol Surg Res*; 109 : 103675 PMID 37683912
- C** Mabrouk A, Ollivier M, Fayard JM, Batailler C, Bouguennec N, Tardy N & al. High tibial osteotomy is equally effective for varus malaligned knees with either virgin or wrecked medial meniscus: An age and gender-matched secondary analysis of a Francophone Arthroscopy Society Symposium. *Orthop Traumatol Surg Res*; 109 : 103650 PMID 37364820
- C** Maloberti A, Intravaia RCM, Mancusi C, Cesaro A, Golia E, Ilaria F & al. Secondary Prevention and Extreme Cardiovascular Risk Evaluation (SEVERE-1), Focus on Prevalence and Associated Risk Factors: The Study Protocol. *High Blood Press Cardiovasc Prev*; 30 : 573-583 PMID 38030852
- C** Masson E, Ewers M, Paliwal S, Kume K, Scotet V, Cooper DN & al. The PRSS3P2 and TRY7 deletion copy number variant modifies risk for chronic pancreatitis. *Pancreatology*; 23 : 48-56 PMID 36517351
- C** Nguyen J, Lefèvre JH, Bouchet-Doumenq C, Creavin B, Voron T, Chafai N & al. Surgery for synchronous and metachronous colorectal cancer: segmental or extensive colectomy? *Surg Today*; 53 : 338-346 PMID 36449083
- C** Nguyen, MV ; Chaves, C ; Crenn, V ; Bellemère, P. Percutaneous fixation of scaphoid fractures through the snuffbox: an anatomical study. *J Hand Surg Eur Vol*; 48: 1207-1213 PMID 37480277
- C** Palmier M, Teniere T, Roussel E, Tortajada P, Pochulu B, Plissonnier D. Endovascular Exclusion of Concomitant Aortic Ruptures at the Proximal and Distal Anchoring Zones of a Previous Complex Endovascular Aortic Repair. *J Vasc Interv Radiol*; 34 : 1280-1282 PMID 37380249
- C** Pelletier S, Djebara A, Freychet B, Carnessechi O, Graveleau N, Louis ML & al. Medial meniscal repair in stable knees: Survival rate and risk factors for failure at a minimum of 5 years. *Orthop Traumatol Surg Res*; 109 : 103681 PMID 37690604
- C** Perruisseau-Carrier A, Artz M, Ta P, Seizeur R, Hu W, Le Nen D. Feasibility of the abductor pollicis longus hemitendon transfer for thumb opposition: An anatomical study. *Orthop Traumatol Surg Res*; 109 : 103548 PMID 36638865
- C** Piek AR, Peymani A, Dobbe JGG, Buijze GA, Chammas M, Streekstra GJ & al. Madelung Deformity: Radioscapholunate Arthrodesis With a Neo-DRUJ. *Hand (N Y)*; 18 : 17S-23S PMID 34096342
- C** Pivot X, Spano JP, Espie M, Jouannaud C, Pottier V, Moreau L & al. Long Terms Follow-Up of the Randomized MetaspHER Study Comparing Intravenous Versus Subcutaneous Trastuzumab in Patients With HER2-Positive Metastatic Breast Cancer. *Clin Breast Cancer*; 23 : e412-e419 PMID 37423801
- C** Puscasiu L, Mircea O, Hennetier C, Rubod C, Schmied R, Resch B & al. Pregnancy rate following endometriomas management by ablation using plasma energy, cystectomy and drainage: A three-arm comparative study. *Int J Gynaecol Obstet*; 160 : 947-954 PMID 36085559
- C** Regas, I ; Pichonnet, M ; Pluvy, I ; Obert, L ; Bellemère, P ; Chaves, C & al. The impact of COVID-19 on hand surgery: A French retrospective comparative study in COVID-19 and non-COVID-19 hand trauma centers. *Orthop Traumatol Surg Res*; 109: 103118 PMID 34656810
- C** Rogé M, Pointreau Y, Sargos P, Meyer E, Schick U, Hasbini A & al. Randomized phase II trial in prostate cancer with hormone-sensitive Oligometastatic relapse: Combining stereotactic ablative radiotherapy and durvalumab (POSTCARD GETUG P13): Study protocol. *Clin Transl Radiat Oncol*; 40 : 100613 PMID 36968576
- C** Roux A, Haen TX, Iordanoff I, Laporte S. Model of calf muscle tear during a simulated eccentric contraction, comparison between ex-vivo experiments and discrete element model. *J Mech Behav Biomed Mater*; 142 : 105823 PMID 37054574
- C** Sacco R, Munoz MA, Billuart F, Lalevée M, Beldame J. Validation of an Automated Optical Scanner for a Comprehensive Anthropometric Analysis of the Foot and Ankle. *Bioengineering (Basel)*; 10 PMID 37627853
- C** Salet E, Legghe B, Barouk P, Stiglitz Y, Dallaudière B, Lintings PF & al. Imaging of the post-operative hallux valgus: what do radiologists need to know? *Skeletal Radiol*; 52 : 1629-1637 PMID 36949167
- C** Saracco A, Rivière C, Bouchard GR, Villet L. Limb alignment changes with knee flexion: A study based on CAS data. *Knee*; 41 : 232-239 PMID 36736065

- C Savoye-Laurens T, Verdier N, Wettstein M, Baulot E, Gédouin JE, Martz P.** Labral tears in hip dysplasia and femoroacetabular impingement: A systematic review. *Orthop Traumatol Surg Res* ; 109 : 103539 PMID 36587762
- C Scailteux LM, Vincendeau S, Gravis G, Mathieu R, Balusson F, Kerbrat S & al.** Real-World Treatment Patterns Among French Patients With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer Under Abiraterone or Enzalutamide. *Clin Genitourin Cancer* ; 21 : e362-e369 PMID 37188606
- C Scharbarg E, Walter A, Lecoin L, Gallopin T, Lemaître F, Guille-Collignon M & al.** Prostaglandin D₂ Controls Local Blood Flow and Sleep-Promoting Neurons in the VLPO via Astrocyte-Derived Adenosine. *ACS Chem Neurosci* ; 14 : 1063-1070 PMID 36847485
- C Seigneur M, Hascoët E, Chaux AG, Lesclous P, Hoornaert A, Cloitre A.** Characteristics and management of dental implants displaced into the maxillary sinus: a systematic review. *Int J Oral Maxillofac Surg* ; 52 : 245-254 PMID 35778233
- C Seizilles de Mazancourt, E ; Khene, Z ; Sbizerra, M ; Kaulanjan, K ; Plassais, C ; Bardet, F & al.** Cut-off time for surgery and prediction of orchiectomy in spermatic cord torsion: a retrospective multicentric study over 15 years. *World J Urol* ; 41: 3789-3794 PMID 37897515
- C Siala M, van der Stok J, Durdzinska A, Kulkarni K, Knie NF.** Success in the European Board of Hand Surgery Diploma: candidates' views from various countries. *J Hand Surg Eur Vol* ; 48 : 598-602 PMID 37066618
- C Silvestre A, Bise S, Delavigne C, Merle F, Caudron S, Pesquer L & al.** Intra-articular Injection of Bone Marrow Concentrate for Treatment of Patellofemoral Osteoarthritis: Preliminary Results Utilizing an Ultrasound-Guided Marrow Harvesting Technique. *J Vasc Interv Radiol* ; 34 : 71-78.e1 PMID 36244631
- C Silvestre A, Lintings PF, Pesquer L, Meyer P, Moreau-Durieux MH, Dallaudiére B.** Retrospective Analysis of Responders and Impaired Patients with Knee Osteoarthritis Treated with Two Consecutive Injections of Very Pure Platelet-Rich Plasma (PRP). *Bioengineering (Basel)* ; 10 PMID 37627807
- C Thès A, Andrieu M, Cordier G, Molinier F, Benoist J, Colin F & al.** Five-year clinical follow-up of arthroscopically treated chronic ankle instability. *Orthop Traumatol Surg Res* ; 109 : 103649 PMID 37364821
- C Thiveaud D, Durand F, Hajjar J, Le Dinh E, Metz V, Napoleon B & al.** Costs of purchase, maintenance, microbiological control, and reprocessing of a reusable duodenoscope. *Endosc Int Open* ; 11 : E873-E879 PMID 37942444
- C Thorel D, Ingen-Housz-Oro S, Benaïm D, Daïen V, Gabison E, Saunier V & al.** Ocular sequelae of epidermal necrolysis: French national audit of practices, literature review and proposed management. *Orphanet J Rare Dis* ; 18 : 51 PMID 36906580
- C Van Spanning SH, Lafosse T, Verweij LPE, van Rijn SK, Lafosse L, Buijze GA.** Predictive value of Gagey's hyperabduction test in identifying inferior glenohumeral ligament lesions. *Orthop Traumatol Surg Res* ; 109 : 103500 PMID 36470371
- C Yzet C, Rivory J, Wallenhorst T, Grainville T, Legros R, Lepilliez V & al.** A 3D-printed pedal fixator for connecting different pedal-operated tools reduces the number of mistakes during endoscopic submucosal dissection. *Endosc Int Open* ; 11 : E635-E640 PMID 37928772
- D Azarpira, M ; Katz, G ; Chaves, C ; Gübeli, A ; Guidi, M ; Chikhani, S & al.** Translation of a patient-surgeon relationship assessment instrument (Q-PASREL) into six languages. *Hand Surg Rehabil* ; 42: 337-341 PMID 37329983
- D Baboudjian M, Lebacle C, Gondran-Tellier B, Hutin M, Olivier J, Ruggiero M & al.** Who Is at Risk of Death after Renal Trauma? An Analysis of Thirty-Day Mortality after 1,799 Cases of Renal Trauma. *Urol Int* ; 107 : 165-170 PMID 35390797
- D Barrière P, Hamamah S, Arbo E, Avril C, Salle B, Pouly JL & al.** A real-world study of ART in France (REOLA) comparing a biosimilar rFSH against the originator according to rFSH starting dose. *J GYNéCOL Obstet Hum Reprod* ; 52 : 102510 PMID 36403900
- D Baykal-Köse S, Voldoire M, Desterke C, Sorel N, Cayssials E, Johnson-Ansah H & al.** ENOX2 NADH Oxidase: A BCR-ABL1-Dependent Cell Surface and Secreted Redox Protein in Chronic Myeloid Leukemia. *Turk J Haematol* ; 40 : 101-117 PMID 37026766
- D Beer K, Biesman B, Cox SE, Smith S, Picault L, Trevidic P.** Efficacy and Safety of Resilient Hyaluronic Acid Fillers Injected with a Cannula: A Randomized, Evaluator-Blinded, Split-Face Controlled Study. *Clin Cosmet Investig Dermatol* ; 16 : 959-972 PMID 37038451
- D Beldame J, Charpail C, Sacco R, Lalevée M, Duparc F.** Advantages of ultrasound identification of the distal insertion of the calcaneofibular ligament during ligament reconstructions. *Surg Radiol Anat* ; 45 : 1063-1068 PMID 37369810
- D Benyoussef AA, Arzel F, Cochener B.** 3-month post-procedural evaluation of a combined intense pulsed light and photo-biomodulation system in the treatment of meibomian gland dysfunction. *J Fr Ophtalmol* ; 46 : 873-881 PMID 37068975

- D** Beust L, Lucas D, Pougnet R, Loddé B. COVID-19 on board a cruise ship: medical management. *Int Marit Health*; 74 : 83-88 PMID 37417840
- D** Beust L, Lucas D, Pougnet R, Loddé B. Responses to the correspondence on «COVID-19 on board a cruise ship: medical management». *Int Marit Health*; 74 : 279 PMID 38111250
- D** Boisbouvier S, Bayart É, Chamois J, Clavère P, Corbin S, De Oliveira A & al. [Survey by SFRO, SNRO and AFPPE about the evolution of the radiation therapist profession in France]. *Cancer Radiother*; 27 : 712-717 PMID 37891038
- D** Bourcier C, Boisbouvier S, Bayart É, Chamois J, Clavère P, Corbin S & al. [Radiation therapists shortage in France: Organizational consequences and difficulties in deploying new missions and/or tasks delegation]. *Cancer Radiother*; 27 : 577-582 PMID 37596123
- D** Brilhault, JM ; Auboyneau, G ; Rony, L. Total Ankle Replacement in Cavovarus Deformity: How Far Can We Go? *Foot Ankle Clin*; 28: 833-842 PMID 37863538
- D** Camenzind RS, Martin Becerra J, Tondelli TO, Gossing L, Serane-Fresnel J, Lafosse T & al. Correlation between preoperative clinical examination and intraoperatively found subscapularis tendon tear. *Eur J Orthop Surg Traumatol*; 33 : 373-379 PMID 35006313
- D** Claudic Y, Perruisseau-Carrier A, Ta P, Seizeur R, Hu W. Anatomic Study of the Integrity of the Breast Lymphatic Network With Indocyanine Green in Breast Implant Surgery Through the Axillary Approach. *Ann Plast Surg*; 90: S112-S119 PMID 36752502
- D** Collet A, Attias P, Lacou M, Fieschi C, Moktefi A, Sannier A & al. AA-type amyloidosis associated with lymphoma: a study of 19 cases including 5 new French cases and a systematic literature review. *Leuk Lymphoma*; 64 : 1857-1863 PMID 37493601
- D** Delorme T, Latrille A, Facy O. How to do robotic Ivor Lewis esophagectomy for lower third oesophageal cancer. *ANZ J Surg*; 93 : 1355-1356 PMID 36629384
- D** Delsa H, Bellahammou K, Okasha HH, Ghalim F. Cheesy material on macroscopic on-site evaluation after endoscopic ultrasound-guided fine-needle biopsy: Don't miss the tuberculosis. *World J Clin Cases*; 11 : 2181-2188 PMID 37122512
- D** Dreant N. Editorial. *Hand Surg Rehabil*; 42 : 1 PMID 36228951
- D** Dreant N. Editorial. *Hand Surg Rehabil*; 42 : 463 PMID 37866480
- D** Dréant N. Treatment of chronic scapholunate instability according to the functional demand of the wrist. *Hand Surg Rehabil*; 42 : 175-183 PMID 37004985
- D** Garetier M, Rousset J, Makki K, Brochard S, Rousseau F, Salem DB & al. Assessment and comparison of image quality between two real-time sequences for dynamic MRI of distal joints at 3.0 Tesla. *Acta Radiol*; 64 : 1093-1102 PMID 35616984
- D** Guindolet D, Disegni H, Martin GC, Azar G, Hardy S, Cochereau I & al. Predictive factors of graft detachment and rebubbling after descemet membrane endothelial keratoplasty. *Int Ophthalmol*; 43 : 1511-1521 PMID 36463376
- D** Lakehayli Z, Philips P, Margoum A, Saoudi A, Hmaid L, Nejjar I & al. What effective technique to differentiate radiation brain necrosis from a tumor progression in patients treated with radiation: A monocentric retrospective study combining the MRI TRAMs technique and the (¹⁸F)-dopa PET/CT. *Cancer Radiother*; 27 : 273-280 PMID 37080856
- D** Le Droguene E, Bulteau S, Deschamps T, Thomas-Ollivier V, Brichant-Petitjean C, Guitteny M & al. Dynamics of Depressive and Psychomotor Symptoms During Electroconvulsive Therapy in Older Depressive Patients: A Case Series. *J ECT*; 39 : 255-262 PMID 37310091
- D** Lebon D, Dujardin A, Caulier A, Joris M, Charbonnier A, Gruson B & al. Ruxolitinib-induced reactivation of cytomegalovirus and Epstein-Barr virus in graft-versus-host disease. *Leuk Res*; 125 : 107005 PMID 36580876
- D** Lebrun F, Marty PA, Quintyn JC, Thariat J, Bailleul H. [High energy proton therapy for extraocular tumors, neurotrophic keratitis and functional consequence: A series of 3 cases]. *J Fr Ophthalmol*; 46 : 841-850 PMID 37625997
- D** Lejoyeux R, Bonnin S, Guindolet D, Jacquiod B, Erol O, Le Mer Y & al. Incidence and clinical significance of fovea plana in the French population with age-related cataract. *Eur J Ophthalmol*; 33 : 1683-1686 PMID 36567486
- D** Martinho T, Zbinden J, Ono Y, Amiri A, Collin P, Lädemann A. Long Head of the Biceps Pediculated Autograft Augmentation of Arthroscopic Subscapularis Repair. *Arthrosc Tech*; 12 : e1391-e1398 PMID 37654870

- D** Mesnard B, Hetet JF, Couteau E, Fosse A, Bocquillon V, Gignoux A & al. Management of testicular cancer: Practice survey in localized stage. *Can Urol Assoc J*; 17 : E236-E243 PMID 37581556
- D** Nhari M, Bailleul H, Bricout M, Loria O, Nguyen AM, Kodjikian L & al. Optical coherence tomography angiography findings in retinal cavernous hemangioma: New cases and review of the literature. *J Fr Ophtalmol*; 46 : 1222-1226 PMID 37872067
- D** Petit C, Donval L, Chandeze MM, Chis C, Joste M, Panel P. Surgery of abdominal wall endometriosis associated with clear-cell carcinoma: Case report and review. *J GYNÉCOL Obstet Hum Reprod*; 52 : 102561 PMID 36841330
- D** Pichard R, Juvenspan M, Houvet P, Romano S. Radiolunate arthrodesis and scaphoidectomy combined to Sauvé-Kapandji procedure as treatment of wrist osteoarthritis: Clinical and radiological results. *Hand Surg Rehabil*; 42 : 400-405 PMID 37490952
- D** Pinsard M, Fauconnier A, D'Halluin F, Broux PL, Guerin S, Gasmi A & al. Comparison of early loosening vs delayed section of mid-urethral slings for postoperative voiding dysfunction. *Int UroGYNÉCOL J*; 34 : 675-681 PMID 35445807
- D** Salvi C, Besancenot A, Sebahi S, Rinckenbach S, Salomon Du Mont L. Influence of Home Location on Follow-Up Compliance after Endovascular Treatment for Abdominal Aortic Aneurysm. *Ann Vasc Surg*; 93 : 48-55 PMID 36641089
- D** Serratrice N, Faddoul J, Tarabay B, Attieh C, Taifour S, Benkessou B & al. Radiological factors affecting functional outcome after the implantation of BDYN™ dynamic stabilization system for low-grade lumbar degenerative spondylolisthesis. *Neurochirurgie*; 69 : 101456 PMID 37236539
- D** Tandt, D ; Le Lez, ML ; Level, C ; Stach, É ; Cottier, JP ; Pisella, PJ & al. [Management of binocular diplopia in the department of ophthalmic emergencies at the Regional University Hospital of Tours]. *J Fr Ophtalmol*; 46: 449-460 PMID 37029068
- D** Thomas-Joulié A, Houillier C, Antoni D, Créhange G, Jouglar E, Colin P & al. Brain radiotherapy in patients treated for a newly diagnosed primary central nervous system lymphoma: professional practice evaluation in 19 French centers. *Acta Oncol*; 62 : 648-656 PMID 37338525
- D** Tinois J, Danassegarane G, Bretonnier M, Ferré JC, Morandi X, Corniola MV. Multidisciplinary management of posterior fossa dural arteriovenous fistula: A single-center experience. *Neurochirurgie*; 69 : 101389 PMID 36535082
- D** Toure M, Quintyn-Ranty ML, Saguet P, Bouchoucha R, Mouriaux F, Quintyn JC. [Recurrence of palpebral basal cell carcinoma according to histological margins]. *J Fr Ophtalmol*; 46 : 1174-1181 PMID 37867122
- D** Tremblay G, Nguyen TA, Marolleau J, Malhaire JP, Fourcade A, Boussion N & al. Impact of age on the Quadrella index assessing oncological and functional results after prostate brachytherapy: A 6-year analysis. *J Contemp Brachytherapy*; 15 : 89-95 PMID 37215618
- D** Van Vliet A, Léon M, Rattier S, Haddad B, David E. New radiographic monitoring indices for total trapeziometacarpal prostheses. *Hand Surg Rehabil*; 42 : 310-317 PMID 37142124
- D** Alexandre J, Le Frère-Belda MA, Angelergues A, Ferron G, Treilleux I, Gaillard AL & al. [Not Available]. *Bull Cancer*; 110 : 6S34-6S43 PMID 37573037
- E** Bassi S, Pinar U, Di Maria S, Gambachidze D, Manach Q, Chartier-Kastler E. Ambulatory peri-bulbar implantation, revision and replacement of Artificial Urinary Sphincter in neurogenic and non-neurogenic male patients: A preliminary feasibility study over a one-year experience. *Prog Urol*; 33 : 377-383 PMID 36925358
- E** Bauer S, Dietz B, Collin P, Neyton L, Blakeney W, Zumstein M. [Chronic posttraumatic shoulder instability]. *Unfallchirurgie (Heidelb)*; 126 : 145-154 PMID 36729203
- E** Bauer S, Dietz B, Collin P, Neyton L, Blakeney W, Zumstein M. [Open Latarjet-Patte-Procedure with Walch's technique : Tips, tricks and avoidance of complications]. *Unfallchirurgie (Heidelb)* ; 126 : 155-160 PMID 36729204
- E** Beirnaert J, Benarroche D, Tabourin T, Weis S, Faix A, Beley S & al. [French language validation of the SSIPI questionnaire assessing the satisfaction of patients with penile implant]. *Prog Urol*; 33 : 21-26 PMID 36153223
- E** Bourien H, Lefevre LB, Mouret-Reynier MA, Asselain B, Lucas B, Gavoille C & al. Real-World Data on Olaparib in Relapsed BRCA-mutated Ovarian Cancer: A Multicenter GINECO RETROLA Cohort Study. *Anticancer Res*; 43 : 653-662 PMID 36697069
- E** Bulstra AEJ, Vidovic AJ, Doornberg JN, Jaarsma RL, Buijze GA. Scaphoid Length Loss Following Nonunion Is Associated with Dorsal Intercalated Segment Instability. *J Wrist Surg*; 12 : 407-412 PMID 37841362
- E** Deffieux X, Rousset-Jablonski C, Gantois A, Brillac T, Maruani J, Maitrot-Mantelet L & al. [Pelvic exam in GYNÉCOlogy and obstetrics: Guidelines for clinical practice]. *GYNÉCOL Obstet Fertil Senol*; 51 : 297-330 PMID 37258002
- E** Izérable B, Boudaoud N, Poli-Merol ML, Pons M, Léon P. [Outpatient surgery for penile hypospadias in pediatric urology: A monocentric experience with a mean follow-up of 3 years]. *Prog Urol* ; 33 : 474-480 PMID 37516601

- E** Jorda P, Hullot J, Crouzet A, Poteau A, Carrilho J, De Gournay E & al. [Psychological impact of the announcement of an abnormal cervical smear: How to improve patient experience and information? COLANX: a multicenter study in Seine-Maritime]. *GYNéCOL Obstet Fertil Senol*; 51 : 193-199 PMID 36804626
- E** Kalantan M, Vienney N, Guillot Tantay C, Rouporet M, Akakpo W. [Results of subinguinal microsurgical varicocelectomy]. *Prog Urol*; 33 : 481-487 PMID 37537033
- E** Latrille A, Rault A, Ghebriou D, Magallon C, Vallée A, Facy O. [COSA 80: Oncologic surgery in the elderly patients]. *Bull Cancer*; 110 : 616-622 PMID 37055308
- E** Macken AA, Lans J, Özkan S, Kramer S, Jupiter JB, Chen NC. Outcomes of Flexor Pollicis Longus Reconstruction for Volar Plate Related Ruptures. *J Hand Microsurg*; 15 : 212-218 PMID 37388558
- E** Maurizot A, Chabay S, Roger G, Tapiero S, Georges JL, Flaujac C & al. Incidence of deep venous thrombosis in COVID-19 critically ill patients treated with intermediate-dose of heparin for thromboprophylaxis: The COVIDOP-DVT observational study. *Vascular*; 17085381231165100 PMID 37009990
- E** Maximen J, Rossetti A, Vallée N, DE Geyer A, Dreano T, Ropars M. Fractures of the fifth metacarpal neck treated by syndactyly: functional and quality of life outcomes of a series of 39 patients. *Acta Orthop Belg*; 89 : 225-231 PMID 37924538
- E** Pautier P, Genestie C, Gladieff L, Kurtz JE, Lortholary A, de La Motte Rouge T & al. [Not Available]. *Bull Cancer*; 110 : 6S44-6S50 PMID 37573038
- E** Pawlak KM, Tehami N, Maher B, Asif S, Rawal KK, Balaban DV & al. Role of endoscopic ultrasound in the characterization of solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas. *World J Gastrointest Endosc*; 15 : 273-284 PMID 37138939
- E** Peinoit A, Muzellec L, Som M, Edeline J, Thibault R, Neveu E & al. Evolution of parenteral nutrition practices in a comprehensive cancer center: Comparative audits. *Bull Cancer*; 110 : 758-767 PMID 36935318
- E** Roche CP, Flurin PH, Wright TW, Zuckerman JD. Comparison of Survivorship and Failure Modes Between Anatomic and Reverse Total Shoulder Arthroplasty Across Multiple Government Joint Registries for a Single Platform Shoulder System. *Bull Hosp Jt Dis (2013)*; 81 : 141-150 PMID 37200333
- E** Rousseau P, Poinas A, Masson D, Bach-Ngohou K, Nguyen M, Le Moigne M & al. Insulin Growth Factor-1 Status in Hidradenitis Suppurativa: A French Institutional Pilot Study. *Acta Dermatovenerol Croat*; 31 : 55-62 PMID 38006364
- E** Vuillemin V, Guerini H, Thévenin F, Sibilleau E, Corcos G, Khaled W & al. Bone Tissue in Magnetic Resonance Imaging: Contribution of New Zero Echo Time Sequences. *Semin Musculoskelet Radiol*; 27 : 411-420 PMID 37748464
- NC** Ahmed AS, Lafosse T, Graf AR, Karzon AL, Gottschalk MB, Wagner ER. Modern Treatment of Neurogenic Thoracic Outlet Syndrome: Pathoanatomy, Diagnosis, and Arthroscopic Surgical Technique. *J Hand Surg Glob Online*; 5 : 561-576 PMID 37521545
- NC** Buijze GA, Mariaux S, van Spanning SH, Verweij LPE, van Rijn SK, Lafosse L & al. The O'Brien test demonstrates a higher diagnostic value in identifying posteroinferior labral tears than superior labral anterior to posterior (SLAP) tears. *JSES Int*; 7 : 67-71 PMID 36820434
- NC** Chebbi A. [Sexual dysfunction after prostate cancer treatment]. *Rev Prat*; 73 : 879-884 PMID 38354013
- NC** De La Selle H, Lascar T, Clappaz P, Decrette E, van Rooij F, Saffarini M & al. Reverse Shoulder Arthroplasty for Patients with Massive Rotator Cuff Tears or Cuff Tear Arthropathies at a Minimum Follow-up of 7 Years. *J Shoulder Elb Arthroplast*; 7 : 24715492231157700 PMID 36824060
- NC** Howell SM, Hull ML, Nedopil AJ, Rivière C. Caliper-Verified Kinetically Aligned Total Knee Arthroplasty: Rationale, Targets, Accuracy, Balancing, Implant Survival, and Outcomes. *Instr Course Lect*; 72 : 241-259 PMID 36534860
- NC** Regas, I ; Pichonnat, M ; Pluvy, I ; Obert, L ; Bellemère, P ; Chaves, C & al. [The impact of COVID-19 on hand surgery: A French retrospective comparative study in COVID-19 and non-COVID-19 hand trauma centers]. *Revue de chirurgie orthopedique et traumatologique*; 109: 41-47 PMID 34667485
- NC** Rigault E, Lacas B, Glehen O, Smith D, Dupont-Bierre E, Guimbaud R & al. Intra-arterial hepatic bevacizumab and systemic chemotherapy in hepatic metastasis of colorectal cancer: A phase II multicentric trial in second-line treatment. *Cancer Treat Res Commun*; 34 : 100674 PMID 36565566
- NC** Zakine G, Perruiseau-Carrier A, Becker C, Sedel F, Téot L, Barritault D. A Retrospective Self-Controlled Study Evaluating the Prophylactic Effects of CACIPLIQ20 on Postsurgical Scars. *Aesthet Surg J Open Forum*; 5 : ojad031 PMID 37051418



A photograph of a smiling woman with dark hair and a greyhound dog, both looking out over a blurred green landscape. The woman is in the foreground, smiling, and the dog is behind her, also looking forward. The background is a soft-focus green field with trees.

LA RECHERCHE

VIVALTO SANTÉ

Accompagner les praticiens pour
mieux soigner les patients

Conception et réalisation : Direction de la Recherche Vivalto Santé - Agence Youz

Iconographie : Istockphoto. Théo Delhaste Photographe. Benjamin Hincker.DR

LA RECHERCHE

VIVALTO SANTÉ

Accompagner les praticiens pour
mieux soigner les patients

GCS VS ERI

61 avenue Victor Hugo
75116 PARIS

Direction de la Recherche Clinique

GIE Vivalto Santé
9 bd de la Boutière
35760 St Grégoire

DRC : DRC@vivalto-sante.com
CERC VS : irb-cerc@vivalto-sante.com



Pour accéder
à [l'espace recherche](#)



www.vivalto-sante.com

Suivez @vivaltosante sur les réseaux sociaux.

